

EPÖL ÉS KÖRNYÉKE LEPKEFAUNÁJA

SZABÓKY CSABA¹ & KUTASSY GYÖRGY²

¹H–1034 Budapest Bécsi út 88.

szaboky@erti.hu

²H – 2526 Epöl, Panoráma u. 6.

SZABÓKY, CS. & KUTASSY, GY.: *The Lepidoptera of Epöl and its surroundings*

Abstract: In the 10 years of our faunistic investigations we recorded 1438 Lepidoptera species in Epöl (Gerecse Mts, Hungary). This number includes 807 Microlepidoptera and 631 Macrolepidoptera species. We observed 47 species protected in Hungary, as listed in **Table 1**. As a new record for the fauna of Hungary, the occurrence of *Phyllonorycter scabiosella* is of outstanding faunistic value. The observation of *Euchnognophos variegata* on Epöl-Kőszikla, previously considered to only occur on the Buda Hills in Hungary, is an equally outstanding result. The record of *Anchinia laureolella* proves Epöl-Kőszikla to be a stepping stone between the known populations of Pilis and Vértes Mountains. The records of migratory moths *Utetheisa pulchella*, *Eublemma ostrina*, *Eublemma parva*, *Mythimna unipuncta*, *Euchromius ocella*, and *Hellula undalis* are also of great significance. The narrow sideband of the brook of Úny crossing the area serves as a habitat for a great number of wetland species. To mention but the most interesting of these, we recorded *Aristotelia subdecurtella*, *Pyroderces klimeschi*, *Mompha divisella*, *Mompha bradley*, *Arenostola phragmitidis*, *Acronicta alni* and *Acleris aspersana*. *Chilo suppressalis*, found for the first time 7 years ago in Hungary, has also been observed. The number of pine and juniper feeding species is relatively high, as compared to other regions of Hungary. The rarest of these include: *Blastesthia posticana*, *Rhyacionia hafneri*, *Gravitarmata margarotana*, *Argyresthia trifasciata*, *Dichomeris marginella*, and *Aethes rutilana*.

Keywords: Lepidoptera, faunistics, protected species, new moths for Hungary.

Bevezetés

A Gerecse a Visegrádi-hegység–Pilis tömb és a Tatai-árokhatárolt Vértes közé ékelődik, északon a Dunáig terjeszkedik. A terület középső részén, közel észak-dél irányban húzódik a Gerecse vonulat, melynek legmagasabb pontja a Gerecse, 634 méter. A Gerecsére jellemző az alacsony térszint. A nyugati részén található nagyobb erdőfoltoktól eltekintve vi-

szonylag sűrűn lakott. Az arányaiban meglehetősen nagy mezőgazdasági területek között – kis szigetekként – a kiemelkedések őrzik a terület valamikori növényzetét és állatvilágát. A fragmentumokban időszakonként intenzív legeltetés folyik.

A Gerecse – az előzőekben vázolt domborzati viszonyai miatt – lepkész szempontból nem tartozik az „izgalmas” területek közé. Úthálózata közepes minőségű, és a lakatlan területekre (pl. erdőkre) vezető földutak jelentős része sorompóval védett. Ismereteink szerint a területen komolyabb lepkészeti (Macrolepidoptera) kutatásokat csak Herczig Béla végzett (HERCZIG 1968, 1985, 1986). Az 1980-as évek első felében meghirdetett „Gerecse lepkevilága” programban Herczig Bélán kívül más lepkész nem jeleskedett. Napjainkban Polonyi Vilmos Zsámbékon és környékén, elsősorban a Nyakas-hegyen végez lepkefaunisztikai céllal gyűjtéseket.

Epölön a faunisztikai vizsgálatok tíz éve folynak. Az ismereteink bővítéséhez nagy segítséget nyújtott a tíz évvel ezelőtt üzembe helyezett fénycsapda. Rácz Gábor – miután Bakonykútiban befejezte a fénycsapdás megfigyeléseket – a csapdát önzetlenül átengedte, s az Epöltre került.

Anyag és módszer

A vizsgálatok központi helyszíne Epöl település nyugati oldalán, az Őr-hegy lábánál található. A Panoráma utca 6. a falu legmagasabban fekvő utcájának a legutolsó telke. Az ingatlant egyik oldalon a falu határolja, a másik oldalon mezőgazdasági terület fekszik, ahol egymást követő években búzát, napraforgót és kukoricát termesztettek. A gyümölcsöskerteken túl, az Őr-hegy oldalában, mintegy 300 méterre kökénnyel, galagonyával szegélyezett molyhostölgyes vegyes erdő található. A falu legalacsonyabb pontja az Únyi-patak völgye, közel egy kilométerre húzódik. A patak túlsó (jobb oldali) partján a falu határában elhagyott kőbánya fehérlík. A kőbányát gallérlként feketefenyves övezi, a szegélyében jelentős borókás húzódik. Keleti irányban a Kőszikla (316 m) kikopaszodott, kettős csúcsa látható.

A Panoráma utcában a lepkészeti megfigyelések a szokványos fehér lepedős lámpázással kezdődtek. A fénycsapda üzembe helyezését követően számos esetben párhuzamosan üzemelt a két fényforrás. A lepedő és a csapda egymástól 15 méterre helyezkedett el. A két lámpa fénye nem versenyzett egymással, mert mindkét pontra közel azonos számú lepke érkezett. A lepedőnél egy méter magasan, míg a csapdánál két méter magasan világított a 125 w-os Hgl izzó. Véltetően a szintbeli különbség volt a fő ok, hogy a lepkék repülését nem zavarta a másik fény. A fénycsapda meglehetősen szakaszosan, nem minden nap működött. A kora tavasztól késő őszig tartó lámpázásos mintavételek közvetlen környékén az egysíkú növényzet ellenére szinte minden alkalommal új és új fajok kerültek elő.

Néhány faj esetében szembeötlő különbség mutatkozott a fényre repülési kedvben. A szarkalábbagoly (*Periphanes delphini*) kizárólag a lepedőre repült, míg a rózsaszínes aranybagoly (*Euchalcia consona*) kizárólag a fénycsapdába. A törpeszender (*Proserpinus proserpina*) minden évben rendszeresen megjelent, elsősorban a lepedőn, de megjegyzendő hogy a tíz év során egy alkalommal belerepült a fénycsapdába is. Jelentős számban jelentkeztek a nedvességkedvelő fajok, az erdei fajok és a vándorlepkefajok. Az éjszakai gyűjtéseket viszonylag ritkán egészítették ki nappali megfigyelések, ennek ellenére, a szerencsés mintavételeknek köszönhetően tekintélyes nappalilepke-fajlista kerekedett. A hegy oldalában, a töl-

gyesbe kihelyezett varsacsapdák *Pammene*-attraktáns anyaga jól szerepelt, így bukkantunk rá a *Pammene* fajok többségének jelenlétére. Az attraktáns kapszulákat dr. Tóth Miklós (MTA Növényvédelmi Kutató Intézet) bocsátotta rendelkezésünkre.

A Kősziklán generátoros lámpázást végeztünk, mely számos alkalommal reggelig tartott. A gyűjtéseket sokan segítették: Both Veronika, Buschmann Ferenc, Pál Attila, Petrányi Gergely, Polonyi Vilmos, Simonyi Sándor, Szécsényi Lajos és Takács Attila.

Eredmények

A vizsgált területről 1438 lepkefaj került elő. A molylepkék fajsza 807, míg a nagylepkéké 631. A védett fajok száma 47. Az összesített listában a magyar molylista (SZABÓKY *et al.* 2002) és a nagylepke lista (VARGA *et al.* 2004) nevezéktanát követtük. A molylepkék magyar nevei a molylistáéval megegyeznek. A nagylepkék magyar nevei a "Hazai nagylepkéink magyar nevei" kiadványéval (BUSCHMANN & SZABÓKY 2010) egyezők. Természetesen tudomásunk van PASTORÁLIS (2012) molylistájáról, valamint VARGA *et al.* (2010) által készített „Magyarország nagylepkéi” című munkáról is. Az említett két munka számos nevezéktani változást mutat, melyeket az elmúlt években megjelent faunisztikai munkákkal (Bakonykúti, Bakonybél, stb.) való könnyű összevethetőség kedvéért nem vettünk figyelembe.

A tíz éven keresztül végzett faunafeltáró munka nagyszerű eredményeket hozott. A kiemelt részben a lepkéket a következő szempontok szerint tárgyaljuk: védett fajok, szárazság kedvelő fajok, vándor fajok, hegyvidéki fajok, valamint fenyő-boróka fajok. Az önkényesen kijelölt csoportok fajai között néhány esetben átfedések fedezhetők fel, az ilyen fajokat csak az egyik csoportban említjük.

1. táblázat: Epöl területéről kimutatott védett és közösségi jelentőségű lepkefajok. (13/2001. (V.) KÖM rendelet, 2006/105/EK irányelv, 100/2012 (IX.28.) VM rendelet

Magyar és latin név	Védettség	Érték (forintban)
magyar tölgymakkmoly (<i>Pammene querceti</i>)	V	10 000
sárga gyapjasszövő (<i>Eriogaster catax</i>)	V	50 000
tavaszi gyapjasszövő (<i>Eriogaster lanestris</i>)	V	10 000
sávós pohók (<i>Lemonia dumi</i>)	V	10 000
tölgyszender (<i>Marumba quercus</i>)	V	10 000
törpeszender (<i>Proserpinus proserpina</i>)	V	50 000
galajszender (<i>Hyles galii</i>)	V	5 000
kis pávaszem (<i>Saturnia pavonia</i>)	V	10 000
nagy pávaszem (<i>Saturnia pyri</i>)	V	50 000
kardoslepke (<i>Iphiclides podalirius</i>)	V	10 000
fecskéfarkú lepke (<i>Papilio machaon</i>)	V	10 000
citromlepke (<i>Gonepteryx rhamni</i>)	V	5 000
kőkény farkosboglárka (<i>Satyrrium spini</i>)	V	10 000
tölgyfaboglárka (<i>Neozephyrus quercus</i>)	V	5 000
csőröslepke (<i>Libythea celtis</i>)	V	5 000
nappali pávaszem (<i>Nymphalis io</i>)	V	5 000
kis rókalepke <i>Nymphalis urticae</i>)	V	50 000

c-betűs lepke (<i>Polygona c-album</i>)	V	5 000
atalantalepke (<i>Vanessa atalanta</i>)	V	5 000
nagy gyöngyházlepke (<i>Argynnis paphia</i>)	V	5 000
közönséges szemeslepke (<i>Arethusana arethusa</i>)	V	5 000
barna szemeslepke (<i>Hypparchia semele</i>)	V	10 000
hangyabogáncs törpearaszoló (<i>Eupithecia graphata</i>)	V	5 000
sziklaüröm-araszoló (<i>Dyscia conspersaria</i>)	V	5 000
csücskös sziklaaraszoló (<i>Odontognophos dumetata</i>)	V	5 000
tarka sziklaaraszoló (<i>Euchrognophos variegata</i>)	V	50 000
szilfa púposzövő (<i>Dicranura ulmi</i>)	V	5 000
hegyi púposzövő (<i>Ochrostigma velitaris</i>)	V	10 000
magyar púposzövő (<i>Phalera bucephaloides</i>)	V	10 000
csíkos medvelepke (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)	V	5 000
csonkaszárný medvelepke (<i>Ocnogyna parasita</i>)	V	50 000
jakablepke (<i>Tyria jacobaea</i>)	V	5 000
mozaikbagoly (<i>Idia calvaria</i>)	V	5 000
kék övesbagoly (<i>Catocala fraxini</i>)	V	5 000
apró liliombagoly (<i>Metachrostis dardouini</i>)	V	10 000
harangvirág-csuklyásbagoly (<i>Cucullia campanulae</i>)	V	50 000
lilásszürke csuklyásbagoly (<i>Cucullia dracunculi</i>)	V	50 000
vasvirág-csuklyásbagoly (<i>Cucullia xeranthemi</i>)	V	10 000
körtebagoly (<i>Atathmia ambusta</i>)	V	10 000
magyar fésűsbagoly (<i>Dioszeghyana schmidtii</i>)	FV	100 000
hálózatos sóska bagoly (<i>Naenia typica</i>)	V	5 000
sötét őszibagoly (<i>Scotochrosta pulla</i>)	V	5 000
szarkalábbagoly (<i>Periphanes delphinii</i>)	V	10 000
ritka csalánbagoly (<i>Abrostola agnorista</i>)	V	10 000
foltos aranybagoly (<i>Autographa bractea</i>)	V	10 000
csillogó földibagoly (<i>Chersotis fimbriola</i>)	V	50 000
szürkésvörös földibagoly (<i>Xestia sexstrigata</i>)	V	10 000

Szárazságedvelő fajok

Faunisztikai szempontból legjelentősebb eredménynek tartjuk az ördögsem-sátorosmoly (*Phyllonorycter scabiosella*) megtalálását, mert eddig nem volt ismert a magyar faunában. A Panoráma utcában 2009. IX. 22. és 2012. IX. 28. dátummal kerültek elő. A lepke ezek szerint a mesterséges fényre jól repül. Bővebben róla a megjelenés alatt álló cikkben (SZABÓKY 2013) olvashatunk majd.

A Kősziklán való gyűjtéssorozat lepkeanyagának értékelésekor kitűnt, hogy számos faj Epölről csak innen ismert. Ezek a következők: szalmaszínű aprómoly (*Opotege spatulella*), hordós csövesmoly (*Praesolenobia clathrella*), csigahéjas zsákhordólepke (*Apterona helicoidella*), gesztenye sátorosmoly (*Phyllonorycter messaniella*), égerbarka-aranymoly (*Argyresthia goedartella*), sárgarépa-laposmoly (*Agonopterix adpersella*), fehér csíkos zöldmoly (*Scythris vittella*), rozsdamintás díszmoly (*Cephalispheira ferrugella*), kakukkfű-aknázó zsákosmoly (*Coleophora serpyllatorum*), kecskeruta-zsákosmoly (*Coleophora vicinella*), koronafürt-zsákosmoly (*Coleophora oriolella*), feketepettyes zsákosmoly

(*Coleophora unipunctella*), henyeboroszlánmoly (*Anchinia laureolella*), díszes sarlósmoly (*Aristotelia decoratella*), borókarágó sarlósmoly (*Gelechia sabinella*), mezeiüröm-sarlósmoly (*Sophronia consanguinella*), kakukkfűszövő sarlósmoly (*Sophronia humerella*), ibolyafényű övesmoly (*Stomopterix remissella*), fehérvállú sarlósmoly (*Nothris lemniscella*), fényes sárgamoly (*Prochlidonia amiantana*), tisztessű tükrősmoly (*Endothenia nigricostana*), pettyes tükrősmoly (*Metendothenia atropunctana*), keresztsávós karcsúmoly (*Laodamia faecella*), sárgás tűzmoly (*Udea lutealis*), közönséges szemeslepke (*Arethusana arethusana*), kutyabenge-araszoló (*Triphosa dubitata*), hangyabogáncs-törpearaszoló (*Eupithecia graphata*), fakószürke törpearaszoló (*Eupithecia impurata*), selymes sávossaraszoló (*Idaea sericeata*), zanótaraszoló (*Aspitates gilvarius*), nagy zsiklaaraszoló (*Gnophos furvatus*), sötét sziklaaraszoló (*Charissa obscurata*), tarka sziklaaraszoló (*Euchrognophos variegata*), fehéreszöld zuzmóbagoly (*Cryphia domestica*), feketeüröm csuklyásbagoly (*Cucullia artemisiae*), harangvirág-csuklyásbagoly (*Cucullia campanulae*), lilásszürke csuklyásbagoly (*Cucullia dracunculi*), szalmasárga csuklyásbagoly (*Shargacucullia lychnitis*), homoki szegfűbagoly (*Hadena irregularis*), foltos szegfűbagoly (*Hadena compta*), sárgamintás tarka-bagoly (*Polymixis xanthomista*), menta-bagoly (*Heliothis peltigera*), ritka csalánbagoly (*Abrostola agnorista*), csillogó földibagoly (*Chersotis fimbriola*), gyöngyös földibagoly (*Chersotis margaritacea*), sokszögű földibagoly (*Chersotis multangula*), balkáni földibagoly (*Chersotis rectangula*), szürkésbarna földibagoly (*Dichagyris forcipula*), feketés földibagoly (*Dichagyris nigricans*), közönséges földibagoly (*Euxoa eruta*), nagy földibagoly (*Peridroma saucia*). A felsorolt fajok néhány kivételtől eltekintve (*Opostega spatulella*, *Argyresthia goedartella*) a sziklafüves lejtők, sziklagyepek tipikus lakói, tehát jellemzően idevalók.

Vojnits András a tarka sziklaaraszoló (*Euchrognophos variegata*) fajtól *cavus* néven elkülönített egy alfajt. VARGA *et al.* (2004) nem veszik figyelembe a Budai-hegység „endemizmusának” tartott alfajt. Az epöli „*cavus*”(?) példány (2008.V.30.) egy másik izolált populációjára enged következtetni. Petrányi Gergely szóbeli közlése szerint a *variegata* a Pilisben is megtalálható (Pilisszántó, Kőkereszt, 376 m 2005. IX. 15. leg. Petrányi G.).

Figyelemre méltó a henyeboroszlánmoly (*Anchinia laureolella*) előkerülése, mert eddig csak a Bakonyból, a Vértesből és a Pilisből volt ismert. Hernyójának tápnövénye a henyeboroszlán (*Daphne laureola*).

Nagy meglepetés volt az sárgás tűzmoly (*Udea lutealis*) előkerülése (2006. VII. 31.). Hazai jelenlétéről mintegy 30 éve tudunk (SZABÓKY 1981). A Mátrában megtalált faj azóta csak a Bakonyból és a Bükkből került elő.

Vándorlepkék

Vándorlepkék bármikor és bárhol felbukkanhatnak. Epölön igen sok vándorlepkefaj került elő, így jogosan feltételezhető, hogy a Bécsi-medence irányába mutató „pannon-vándorút” egyik oldalága a Gerecsén vezet keresztül.

A rózsaszínes aranybagoly (*Euchalcia consona*) több példánya került elő (2004. VII. 23., 2005. VI. 15., 2006. VIII. 22.).

A sávós szender (*Hyles livornica*) 2007. VIII. 23-án repült a fénycsapdába.

A szalmagyopár bíborbagoly (*Eublemma ostrina*) egy példányban került elő (2009. X. 7.). A rokon apró vándorbagoly (*Eublemma parva*) első példánya 2006. VII. 8-án jelent meg, de 2009 júniusában sok tucat egyede került elő.

A vörössávós vándoraraszoló (*Rhodometra sacraria*) 2008. IX. 3-án repült fényre. Nagy meglepetés volt a vándor rétibagoly (*Mythimna unipuncta*) 2007. IX. 29-i megjelenése.

Az ezüstcsíkos mozaikmoly (*Euchromius ocella*) ritkán vetődik hazánkba. Epölön 2004. X. 14-én került a fénycsapdába.

A zegzugos tűzmoly (*Hellula undalis*) első hazai példányát Petrich Károly gyűjtötte Velencén (PETRICH 1989). A második ismert hazai példány Epölön, a Panoráma utcában repült fényre 2007. VIII. 25-én.

A déli tükrösmoly (*Crociosema plebejana*) és a hófehér tűzmoly (*Palpita unionalis*) szeptemberben és októberben egyesével jelent meg. Utóbbi faj érvényes latin neve *Palpita vitrealis* (PASTORÁLIS 2012).

A legnagyobb fogás 2006. X. 27-én egy **vérpettyes medvelepke** (*Utetheisa pulchella*) volt. A trópusokon honos, vándorlásra hajlamos fajt Magyarországon utoljára a múlt század első harmadában gyűjtötték.

Az említett fajokon túl az olyan közönséges vándorfajok, mint a gyapottok bagoly (*Heliothis armigera*), a gammalepke (*Autographa gamma*), a sárga rétibagoly (*Mythimna vitellina*), a nagy földibagoly (*Peridroma saucia*) és a zöldes csipkésbagoly (*Phlogophora meticulosa*), rendszeresen jelentek meg a fénycsapdában.

A mentabagoly (*Heliothis peltigera*) egy példánya került elő a Kősziklán (2008. VII. 26.).

A vándoraraszoló (*Orthonama obstipata*) példányai elsősorban szeptember-október folyamán jelentek meg rendszeresen. Érdekességgént megemlítjük, hogy az igen erős ivari kétalakúsággal rendelkező fajból csak nőstények kerültek elő.

A keleti vándorbagoly (*Spodoptera exigua*) minden évben rendszeresen megjelenik, július és október között viszonylag gyakori.

A barnasávós vándorbagoly (*Prodotis stolidus*) és az ibolyabarna vándorbagoly (*Dysgonia algira*) minden év júniusától októberéig rendszeresen jelen van. Enyhe telek esetén magyarországi áttelelésük nem kizárt.

Nagy szenzációként hatott a **vándor kertibagoly** (*Lacanobia blenna*) előkerülése 2009. IX. 3-án. A 15 éve faunára újként közölt fajból (HREBLAY & SZABÓ 1997) eddig csak bako-nyi, jászági (BUSCHMANN 2011) Tápió-vidéki (BUSCHMANN 2012) és bélmegyeri példányokról van tudomásunk. A lepke a nedves biotópokat kedveli.

Nedvességkedvelő fajok

Az Epöl határában csordogáló Únyi-patak hosszabban aszályos időszakokban sem apad el, így kitűnő életteret biztosít a nedvességkedvelő fajoknak. Meglepően sok lepkéfajt rögzítettünk. Rendszeresen, de alacsony egyedszámban került elő a halvány lápibagoly (*Simyra albovenosa*), a lápréti apróbagoly (*Deltote uncula*), a kis nádibagoly (*Archanara dissoluta*), a kétpettyes nádibagoly (*Archanara geminipuncta*), a fényessárga lápibagoly (*Aethes lepigone*), a kormos lápibagoly (*Athetis palustris*), a keskeny nádibagoly (*Chilodes maritima*), a szürkésfehér fűbagoly (*Chortodes morrissii*), a barna lápibagoly (*Hydroecia micacea*), a pontozott rétibagoly (*Leucania obsoleta*), a vörös rétibagoly (*Mythimna pudorina*), a szalmaszínű rétibagoly (*Mythimna straminea*), a lándzsás lápibagoly (*Senta flammea*), a ligeti apróaraszoló (*Perizoma lugdunaria*), a pettyes fűzfaaraszoló (*Cabera exanthemata*), a fehér égeraraszoló (*Cabera pusaria*), a csontszínű molyszölvő (*Cybosia*

mesomella), a hamvas algaaszövő (*Pelusia muscerda*), a lápi algaaszövő (*Pelusia obtusa*), a mocsári medvelepke (*Thumata senex*), a törpepamacsosaszövő (*Nola cristatula*), a kecskefüzőszibagoly (*Agrochola lota*), a sötétmintás fűzbagoly (*Dyschorista ypsilon*), a mocsári bíborbagoly (*Eucarta virgo*) és a kénsárga nádibagoly (*Gortyna flavago*).

Nagy meglepetés volt az égeresek és nyíresek jellemző, de ritka fajának, a felemásshárnyú szigonyos bagolylepkének (*Acronicta alni*) 2012. IV. 25-én való előkerülése. A Dráva mentén, az ország nyugati peremvidékén és a Bakonyban fordul elő rendszeresen.

A jellemzően a Fertő-Hanságban tenyésző sárga nádibagoly (*Arenostola phragmitidis*) 2013. VIII. 9-én került elő Epölről. A mocsarakban időnként és helyenként gyakori fajt az elmúlt években Tokajban és Gánt-Gránáson is megfigyeltük. Utóbbi hely egy száraz molyhostölgyes, ezen az élőhelyen előkerült több példánya bizonyítja, hogy a faj kóborlásra hajlamos, de az sem kizárt, hogy terjedőben van.

A nagyobb kiterjedésű lápok, mocsarak jellemző fajai a hullámcsíkos apróbagoly (*Chortodes minima*) július, a lápi lándzsásbagoly (*Sedina buettneri*) október folyamán rendszeresen megjelent a Panoráma utcában.

Magyarországon a füzikefűró lándzsásmolymoly (*Mompha divisella*) és az angol lándzsásmolymoly (*Mompha bradley*) igen ritka. Az imágók augusztusban kelnek, majd áttelelést követően májusig találkozhatunk velük. Megjegyzendő, hogy a tél folyamán, enyhe időjárás esetén könnyen felébrednek, és bármikor felbukkanhatnak. Mindkét fajt április elején sikerült megfigyelni.

A füzényhajtás-sarlósmoly (*Aristotelia subdecurtella*) több mint húsz éve ismerjük a magyar faunában (SZABÓKY 1994). Epölről 2010. VIII. 16-án került elő egy példánya. Megjegyzendő, hogy az utóbbi években Jászberény környékén és a Tápió-vidék egyes pontjain augusztus-szeptember fordulóján rendszeresen gyűjthető (BUSCHMANN Ferenc ex verb.).

A mocsári tündérmoly (*Pyroderces klimeschi*) egy példánya került elő Epölről 2010. VI. 21-én. Az utóbbi években számos helyen megtalálták hazánkban. A legközelebbi ismert lelőhelye Zsámbék belterülete (leg. Polonyi Vilmos).

Két lepkét, a komlóaknázó tündérmolyt (*Cosmopterix zieglerella*) és a levantei tündérmolyt (*Cosmopterix scribaiella*) az Únyi-patak partján talált levélakna alapján sikerült azonosítani.

Az alábbi lápimolyokból évente egy-két példány érkezett a mesterséges fényre: apácamolymoly (*Monopis monachella*), égerrágó keskenymoly (*Caloptilia elongella*), fűzgöngyölő keskenymoly (*Caloptilia stigmatella*), farkos keskenymoly (*Ornixola caudulatella*), égerrügymoly (*Prays fraxinella*), égerbarka aranymoly (*Argyresthia goedartella*), békabuzogánymoly (*Orthotelia sparganella*), gyászos feketemoly (*Ethmia quadrillella*), agyagsárga lándzsásmolymoly (*Mompha epilobiella*), nádmoly (*Limnaecia phragmitella*), magyar nádmoly (*Atremaea lonchoptera*), sárgafoltos lápimoly (*Monochroa lucidella*), magyar lápimoly (*Monochroa divisella*), fűzbarka-sarlósmoly (*Gelechia muscosella*), nádfűró lepke (*Phragmataecia castaneae*), turjáni sárgamolymoly (*Phtheochroa inopiana*), fűzfalevélmoly (*Acleris hastiana*), nagy szittyómoly (*Bactra robustana*), mocsári tükrösmoly (*Endothenia quadrimaculana*), vízparti tükrösmoly (*Loxorema lacunana*), fűzfónó karcsúmolymoly (*Salebriopsis albicilla*), mocsári mohailonca (*Witlesia pallida*), csikos nádfűrómolymoly (*Chilo phragmitellus*), aranyszínű nádlevélmoly (*Calamatropha aureliella*), óriás nádfűrómolymoly (*Schoenobius gigantella*), fakó nádfűrómolymoly (*Donacaula forficella*), ritka nádfűrómolymoly (*Donacaula mucronella*), tarka vízimoly (*Elophila nymphaeata*), békalencsemoly (*Cataclysta lemnata*), közönséges vízimoly (*Parapoynx stratiotatum*), sásrágó tűzmoly (*Nascia ciliaris*).

Mintegy hét éve van tudomásunk arról, hogy az egyszínű nádfúrómoly (*Chilo suppressalis*) megjelent Magyarországon (Csákvár) (SZEŐKE 2006., FAZEKAS & LÉVAI 2011). Az epöli adat (2012. V. 6.) a kukoricán(!) élő faj terjedésére figyelmeztet.

Több mint egy évtizede került nyilvánosságra, hogy a ritka lápimoly (*Helcystogramma arulensis*) él Magyarországon (PASTORÁLIS *et al.* 2000). A szintén ritka fehérerű lápimollyal (*Helcystogramma albinervis*) együtt gyakran előfordulnak a Panoráma utcában.

Fenyőféléket fogyasztó fajok

A „fenyőlepkék” között említjük a borókát vagy tuját fogyasztó fajokat is. Bár a Panoráma utcában található feketefenyő, erdeifenyő, lucfenyő és vörösfenyő, mégis alacsony az ezeket fogyasztó lepkék száma, ezt mutatja a fénycsapda anyaga. A fenyőket fogyasztó lepkefajok: rozsdabarna erdeifenyő-araszoló (*Pennithera firmata*), változékony fenyőaraszoló (*Thera variata*), szürke fenyőaraszoló (*Semiothisa liturata*), fenyőaraszoló (*Bupalus piniarius*), fenyőbagoly (*Panolis flammea*), fenyőszender (*Hyloicus pinastri*), hamvas fenyőtűmoly (*Cedestis gysseleniella*), szürke fenyőtűmoly (*Cedestis subfasciella*), fenyőtű borzasmoly (*Coleotechnites piceaella*), fenyőrágó borzasmoly (*Exoteleia dodecella*), tobozrágó tükrösmoly (*Piniphila bifasciana*), fenyőtű-tükrösmoly (*Pseudohermenias abietana*), fenyőtűszövő tükrösmoly (*Zeiraphera griseana*), rügyfűró gyantamoly (*Blastesthia turionella*), fenyőhajtás moly (*Cydia strobilella*), tobozrágó karcsú moly (*Dioryctria sylvestrella*), fenyőtűszövő karcsú moly (*Dioryctria simplicella*), fenyőrágó karcsú moly (*Dioryctria abietella*), fenyőilonca (*Rhyacionia buoliana*), piros gyantamoly (*Rhyacionia pinicolana*), tarka gyantamoly (*Rhyacionia pinivorana*). A rokon rácsos gyantamoly (*Rhyacionia hafneri*) hazai jelenlétéről közel tíz éve tudunk (SZABÓKY 2004). Újabban előkerült Jászberény környékéről is (BUSCHMANN *ex verb.*). Epölről minden év májusában és júniusában előkerült egy-egy példány.

Az erdeifenyő gyantamoly (*Blastesthia posticana*) magyarországi előfordulásáról szintén ekkor szereztünk tudomást (SZABÓKY 2004). Az epöli adat az élőhelyi viszonyokra tekintettel meglepő.

Húsz éve tudunk a márványos gyantamoly (*Gravitar marta margarotana*) hazai (Ásotthalom) jelenlétéről (SZABÓKY 1993). A gyantamoly az azóta eltelt időben nagy utat tett meg. Fokozatosan észleltük a következő helyekről: Bugac, Eger, Mátrafüred, Diósjenő, Budapest, Bakony, Sopron, Szalafő, Barcs. A vázoltak ismeretében epöli megjelenése nem meglepő. Április folyamán minden évben tucatnyi példánya került elő.

Minden év október-novemberi időszakban – az erősödő éjszakai fagyok ellenére is – nagy számban repült fényre az őszi boróka-araszoló (*Thera juniperata*).

A borókatű-arany moly (*Argyresthia abdominalis*) 2006. V. 8-án repült fényre. A rokon háromsávós boróka-ezüstmoly (*Argyresthia trifasciata*) 2009. V. 9-én bukkant fel Epölön. A faj hazai jelenlétéről bő tíz évvel ezelőtt értesültünk (GÁL-TNÉ & SZEŐKE 2000). Azóta előkerült a budai Sas-hegyről és az Őrségből. Epöli megjelenése nem meglepő, mert a növénylerakatokból a tápnövényén sokfelé elhurcolják. A borókafűró sarlósmoly (*Gelechia sabinella*) egy példányát 2006. VII. 10-én sikerült begyűjteni. A fehérsávós borókamoly (*Dichomeris marginella*) erősen ragaszkodik élőhelyéhez és tápnövényéhez. Feltételezhető, hogy nagy gradációja lehetett a fajnak, mert 2006 júniusában mintegy fél tucat példánya került a fénycsapdába. Sem előtte, sem utána nem jelentkezett.

Az aranylő sárgamoly (*Aethes rutilana*) hernyója a borókát fogyasztja. Epölön évente egy-egy példánya tévedt a fényre. Ugyancsak egyesével jelent meg a barna fenyőkéregmoly (*Cydia duplicana*). Eddigi tapasztalataink szerint a borókásokra jellemző faj mégél a *Pinus* és *Picea* fajokon is.

Hegyvidéki fajok

Érdekes színező elemek Epölön a magasabb térszintre jellemző „hegyi” fajok. A közép-hegységekre jellemző hegyi csikosaraszoló (*Aplocera praeformata*) 2008. VI. 27-én repült fényre. A fakó téliaraszoló (*Operophtera fagata*) jobbára a bükkösökből ismert lepke. Epölön évente egy-egy példányban jelent meg, november folyamán. A szürke ribiszke-araszoló (*Itame wauaria*) rendszeresen jelen van, de évente szintén csak egy-két példányban. Nagy meglepetés volt az igen jól repülő foltos aranybagoly (*Autographa bractea*) epöli megjelenése 2007. VII. 6-án.

A hegyvidékek tölgyes zónájára jellemző fajok évente egy-egy példányban kerültek elő. Ilyenek a nagy tölgyfaaraszoló (*Hypomecis roboraria*), a tölgyfa-zöldbagoly (*Pseudoips bicolorana*), a hegyi dudvabagoly (*Apamea illyria*), a homályos dudvabagoly (*Apamea pabulatricula*), az őszi zöldbagoly (*Dichonia aprilinea*) és az élénkcsárga őszibagoly (*Jodia croceago*).

Kiemelt értékek

A viszonylagosan meleg kitettségű molyhostölgyesekre jellemző magyar púposzövő (*Phalera bucephaloides*) 2004. VI. 28-án repült fényre, míg a hasonló élőhelyen tenyésző tölgyszender (*Marumba quercus*) több tucat példánya került elő évente.

Epölön az utóbbi években jelent meg a magyar fésűsbagoly (*Dioszeghyana schmidtii*), (2007. IV. 14., 2009. IV. 14., 15., 2013. IV. 20.). Hernyója tápnövényének a tatárjuhart tartották, de bebizonyosodott, hogy a csertölgyet fogyasztja.

A sárgatövű fűrőmoly (*Phalonidia gilvicomana*) a nyirkosabb erdők jellemző faja. Több mint másfél évtizede van tudomásunk hazai jelenlétéről (SZABÓKY 1996). A fajt Fazekas Imre is megtalálta és Szabókytól függetlenül egy időben közölte vele az eredményt.

A Hartig-zsákosmoly (*Coleophora hartigi*) hazai előfordulásáról négy éve van tudomásunk (SZABÓKY *et al.* 2009), Epölön is előkerült.

Nagy meglepetés volt a Budapest környékéről ismert lepke (SZABÓKY 2013), az északi keskenymoly (*Gracillaria loriolella*) megjelenése Epölön 2006. IV. 12-én. Jelen tudásunk szerint ez a harmadik hazai példánya (BUSCHMANN Ferenc szóbeli közlése szerint megkerült a Tápió-vidéken is, de még nem publikálta).

Magyarországon a homokterületekre jellemző, de igen ritka az okkerszínű fűgyökérmoly (*Agriphila poliella*). Epölön 2010. IX. 12-én repült a fényre.

Az elmúlt év meglepetése a havasszépe-keskenymoly (*Caloptilia azaleella*) megjelenése volt (SZABÓKY 2012).

A hárslevél-sátorosmoly (*Phyllonorycter issikii*) (SZABÓKY & CSÓKA 2003), az akáclevél-sátorosmoly (*Phyllonorycter robiniella*) (SZABÓKY & CSÓKA 1997) és a vadgesztenye-

sátorosmoly (*Cameraria ohridella*) (SZABÓKY 1994) rendszeresen jelen van Epölön. Mindhárom faj mérsékeltén jól repül a mesterséges fényre.

Magyarországon több mint 25 éve (PETRICH 1986) vált ismerté a dunántúli kopármoly (*Chilopselaphus balneariellus*). Megtalálását követően újabb példányai kerültek elő Budapestről, a Bakonyból, Gánt-Gránásról és a Naszályról. Epölön évente júniusban egy-egy példány repült a mesterséges fényre.

A vérfű-sodrómoly (*Acleris aspersana*) magyarországi előfordulásáról közel tíz éve számolt be a szerzők egyike (SZABÓKY 2005). Epölön három alkalommal jelent meg (2007. VI. 4., 2009. VI. 26., 2011. VI. 17.).

A tíz évvel ezelőtti tudományra újként leírt ördögcérna zöldmoly (*Scythris buszkoi*) hazai előfordulásáról mintegy három éve van tudomásunk (SZABÓKY & BUSCHMANN 2010). Epölön 2012. és 2013. augusztusában számtalan példánya jelent meg a fényen. Az epöli temető kerítésénél sikerült megtalálni az ördögcérna (*Lycium barbarum*) levelein hámozó hernyóit is.

Jegyzetek a csillaggal megjelölt fajokhoz

A mellékletben található listán néhány fajt csillaggal jelöltünk, ezek valamilyen okból még problémásak:

Mórlepke (*Lypusa maurella*) – Az elmúlt években a mórlepkék közül kiválasztották és tudományra újként leírták a *Lypusa tokari* fajt (SZABÓKY *et al.* 2009). Az addig megvizsgált példányok mind a *tokari* fajnak bizonyultak. Nincs Magyarországon *maurella*? A kérdés kielégítő megválaszolásához meg kell vizsgálni az összes hazai példányt, s amíg ez nem történik meg, addig a *maurella* nevet használjuk.

Kis pávaszem (*Saturnia pavonia*) – Az utóbbi évek vizsgálatai nyomán úgy tűnik, hogy Magyarországon nem a *pavonia*, hanem a hozzá igen hasonló *pavoniella* él. A *pavoniella* a tipikus morfológiai bélyegek alapján elég könnyen elválasztható a *pavonia*-tól, megjegyzendő azonban, hogy a rajzlati bélyegek átfedéseket mutatnak, s a vizsgálatokat nem terjesztették ki az összes ismert hazai példányra. Amíg a vizsgálat megnyugtatóan le nem zárul, addig a *pavonia* nevet használjuk.

Habszegfű-szürkebagoly (*Hadena capsincola*) – Az eddig *Hadena bicruris* néven nyilvántartott faj zömmel a *capsincola*-hoz tartozik, a *bicruris* area határa tőlünk nyugatabbra húzódik. Megjegyzendő, hogy a két faj között léteznek átmeneti alakok, s az újabb vizsgálatok azt mutatják, hogy kis számban előfordul hazánkban a *bicruris* is.

A legújabb megállapítások szerint (VARGA *et al.*, 2012) a **somkóróbagoly** (*Heliothis maritima*) csak az atlanti partvidék körzetében honos, Közép-Európában a *Heliothis adaucta* fordul elő. A vizsgálatok nem terjedtek ki az összes hazai *maritima* példányra, ezért amíg az megnyugtatóan nem történik meg, addig a *maritima* nevet használjuk.

A vizsgálatok azt igazolták, hogy az ázsiai elterjedésű *Diachrysia tutti* nem él Magyarországon. A hozzá hasonló **sárgafényű aranybagolyt** (*Diachrysia stenochrysis*) a szárny középterét keresztbeszelő barna sávjáról lehet felismerni. A vizsgálatok nyomán kiderült, hogy léteznek a rokon *D. chrysitis* fajhoz hasonló átmeneti formák.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki Rácz Gábornak, aki a fénycsapdát – mint kulcsezszközt – önzetlenül rendelkezésünkre bocsájtotta. A kérdéses taxonok határozásában nagy segítségünkre volt Zdenko Tokár (Szlovákia) és Ignac Richter (Szlovákia), köszönetünket irányukba ezúton fejezzük ki. A nevezéktani problémák megoldásában további segítséget nyújtott Pastorális Gábor (Szlovákia); köszönet érte. Köszönjük Petrányi Gergelynek az összefoglaló angol nyelvre fordítását. Utoljára, de nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki Buschmann Ferenc lektori munkájáért.

Irodalom

- 13/2001.(V.9.)KÖM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.
- A Tanács 2006/105/EK irányelve (2006. november 20.) a környezetvédelem területén elfogadott 73/239/EGK, 74/557/EGK és 2002/83/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról.
- A vidékfejlesztési miniszter 100/2012.(IX.28.) rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001.(V.9.) KÖM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM rendelet módosításáról.
- BUSCHMANN, F. (2011): A jászberényi Jász Múzeum nagylepkegyűjteménye. (Macrolepidoptera collection in Musei Jazigiae Jászberényiensis). – Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve **20**: 241-267.
- BUSCHMANN, F. (2012): A Tápió-vidék lepkefaunája (Lepidoptera). – Természetvédelem és kutatás a Tápió-vidéken – Rosalia **7**: 385-500.
- BUSCHMANN, F. & SZABÓKY, CS. (2011): Hazai nagylepkéink magyar nevei. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Adattár **37**. – Szolnok, 102 pp.
- FAZEKAS, I. & LÉVAI, SZ. (2011): A *Chilo luteellus* (Motschulsky, 1866), a *Ch. suppressalis* (Walker, 1863) és a *Pseudobissetia terrestralis* (Christoph, 1885) magyarországi előfordulásáról (Lepidoptera: Crambidae). – Microlepidoptera.hu **3**: 29-35.
- GÁL, T-NÉ & SZEÖKE, K. (2000): Az *Argyresthia trifasciata* Staudinger, 1871 (Lepidoptera, Yponomeutidae) megjelenése Magyarországon *Juniperus* örökzölden. – Növényvédelem, **36(6)**: 301-304.
- GOZMÁNY, L. (1956): Microlepidoptera II. – Molylepkék II. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae), XVI/A, 3. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 136 pp.
- GOZMÁNY, L. (1963): Molylepkék VI. – Microlepidoptera VI. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) XVI/7. – Akadémiai Kiadó, Budapest 289 pp.
- GOZMÁNY, L. (1968): Nappali lepkék – Diurna. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae 91.) XVI/15. 204 pp.
- GOZMÁNY, L. (1970): Bagolylepkék I. – Noctuidae I. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae 102.) XVI/11. 150 pp.
- HERCZIG, B. (1985): Adatok a Gerecse nagylepkéinek ismeretéhez I. – Tata és környéke nagylepkefaunája. – Folia entomologica hungarica, **46(1)**: 259-267.
- HERCZIG, B. (1986): Az *Agriopis ankeraria* Staudinger, 1861 a Gerecsében. – A tatai Herman Ottó Kőr munkái, VMIK., Tata, 7(1980-84): 115-122.

- HERCZIG, B. (1988): A Gerecse lepkészeti kutatásának helyzete, újabb eredményei. – Limes, Komárom Megyei Tudományos Szemle **1**: 29-36.
- HREBLAY, M. & SZABÓ, A. (1997): *Lacanobia* (Diataraxia) blenna new to the fauna of Hungary. – Folia entomologica hungarica **58**: 248-249.
- KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J. (eds) (1996): The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. – Apollo Books, Stenstrup, 380 pp.
- KOSTER, C. & SINEV, S. (2003): Momphidae, Batrachedridae, Stahmopodidae, Agonoxenidae, Cosmopterigidae, Chrysopileidae. – In: P. HUEMER, O. KARSHOLT & L. LYNEBORG (eds): Microlepidoptera of Europe, **5**: 1-387.
- NOWACKI, J. (1998): The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae of Central Europe). – Frantisek Slamka, Bratislava, 151 pp.
- PETRICH, K. (1989): A hazai faunára új két molylepkéfajról (Lepidoptera: Agonoxenidae, et Pyralidae). – Folia entomologica hungarica **50**: 175-177.
- PASTORÁLIS, G. (2012): A Magyarországon előforduló molylepkéfajok jegyzéke 2012 – (A checklist of the Microlepidoptera occurring in Hungary, 2012) (Lepidoptera, Microlepidoptera). – Microlepidoptera.hu **5**: 51-146.
- PASTORÁLIS, G., SZABÓKY, CS. & TOKAR, Z. (2000): Molyfaunisztikai újdonságok IV. – Folia entomologica hungarica **61**: 278-286.
- RAZOWSKI, J. (2001): Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas (Bestimmung – Verbreitung – Flugansort – Lebensweise der Raupen). – Frantisek Slamka, Bratislava, 319 pp.
- RONKAY, G. & RONKAY, L. (2006): A magyarországi csuklyás-, szegfű- és földibaglyok atlasza. – Natura Somogyiensis, Kaposvár **8**: 1-416.
- SLAMKA, F. (1997): Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas Bestimmung – Verbreitung – Flugansort – Lebensweise der Raupen. – Frantisek Slamka, Bratislava, 112 pp.
- SZABÓKY, CS. (1981): A magyar faunára új molylepkék. – Folia entomologica hungarica, **42(1)**: 246-249.
- SZABÓKY, CS. (1994): Adatok a magyar faunára új molylepkékről (Data a the new species of the Hungarian Microlepidoptera Fauna). – Folia entomologica hungarica **55**: 381-383.
- SZABÓKY, CS. (1993): Három, hazánk faunájára új lepkefaj (Lepidoptera). – Folia entomologica hungarica **54**: 185-187.
- SZABÓKY, CS. (1994): A *Cameraria ohridella* (Deschka er Dimič, 1986) előfordulása Magyarországon. – Növényvédelem, **30(11)**: 529-530.
- SZABÓKY, CS. (1994): Molyfaunisztikai újdonságok: a hazai Anchinia-fajok elterjedése és a *Duponchelia fovealis* Zeller, 1847 első hazai adata. – Folia entomologica hungarica, **55**: 406-408.
- SZABÓKY, CS. (1996): Molyfaunisztikai újdonságok II. – Folia entomologica hungarica, **57**: 309-313.
- SZABÓKY, CS. (2004): Molyfaunisztikai újdonságok VIII. (Lepidoptera: Coleophoridae, Elachistidae, Gelechiidae, Tortricidae). – Folia entomologica hungarica, **65**: 248-252.
- SZABÓKY, CS. (2005): New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part IX. (Lepidoptera: Elachistidae, Gracillariidae, Prodoxidae, Tortricidae). – Folia entomologica hungarica, **66**: 253-258.
- SZABÓKY, CS. (2007): A lepkészet története Magyarországon. – Magánkiadás, Budapest, 411 pp.
- SZABÓKY, CS. (2010): A Naszály lepkéi (Lepidoptera) – A Naszály természetrajza. – Rosalia **5**: 657-741.
- SZABÓKY, CS. (2012): New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XIV. (Lepidoptera: Tineidae, Gracillariidae, Gelechiidae, Crambidae). – Folia entomologica hungarica, **73**: 45-51.
- SZABÓKY, CS. (2013): A Soroksári Botanikus Kert lepkéi. – Magánkiadás, Budapest, 143 pp.
- SZABÓKY, CS. (2013): New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XV. (Lepidoptera: Gracillariidae, Gelechiidae, Oecophoridae). – Folia entomologica hungarica, **74**: in print.
- SZABÓKY, CS. & BUSCHMANN, F. (2010): New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary part XIII. (Lepidoptera: Depressariidae, Pyralidae, Scythrididae, Tortricidae, Yponomeutidae). – Folia entomologica hungarica, **71**: 197-202.
- SZABÓKY, CS. & CSÓKA, GY. (1997): A *Phyllonorycter robiniella* Clemens, 1859 akáclevél-aknázómoly megtelepedése Magyarországon. – Növényvédelem, **33(11)**: 569-571.

- SZABÓKY, CS. & CSÓKA, GY. (2003): A hárslevél sátorosmoly (*Phyllonorycter issikii* Kumata, 1962 Lep.: Gracillariidae) előfordulása Magyarországon. – Növényvédelem, **39(1)**: 23-24.
- SZABÓKY, CS., KUN, A. & BUSCHMANN, F. (2002): Checklist of the fauna of Hungary. Volume 2. Microlepidoptera. – Hungarian Natural History Museum, Budapest, 184 pp.
- SZABÓKY, CS., LISKA, J., TOKÁR, Z. & PASTORALIS, G. (2009): New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary part XII. (Lepidoptera: Lypusidae, Bucculatricidae, Yponomeutidae, Depressariidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Gelechiidae, Tortricidae). – Folia entomologica hungarica, **70**: 139-146.
- SZEŐKE, K. (2006): Further new moths species in the Hungarian Fauna (Microlepidoptera: Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae). – Folia entomologica hungarica **67**: 85-88.
- VARGA, Z., RONKAY, L., BÁLINT, ZS. & LÁSZLÓ, M. GY. (2004): A magyar állatvilág fajjegyzéke 3. kötet: Nagylepkék. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 111 pp.
- VARGA, Z. (szerk.) (2010): Magyarország nagylepkéi (Macrolepidoptera of Hungary). – Heterocera Press, Budapest, 253 pp.
- VOJNITS, A., UHERKOVITS, Á., RONKAY, L. & PEREGOVITS, L. (1991): Medvelepkék, szenderek és szövőlepkék – Arctiidae, Sphingidae et Bombyces. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae, 166.) XVI/14. 243 pp.

MELLÉKLET

EPÖL ÉS KÖRNYÉKE MOLYLEPKÉI (MICROLEPIDOPTERA)

Micropterigidae – Aranyszárnyú-ösmolyfélék

Micropterix thunbergella (Fabricius, 1787) – vöröses ösmoly

Eriocraniidae – Ösmolyfélék

Eriocrania subpurpurella (Haworth, 1828) – tölgyaknázó ösmoly

Hepialidae – Gyökérrágó-öslepkéfélék

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) – kis gyökérrágó-lepke

Nepticulidae – Törpemolyfélék

Trifurcula melanoptera Neukerker et Puplesis, 1991 – sötét törpemoly

Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839) – juharmagtörpemoly

Opostegidae – Aprómolyfélék

Opostega spatulella Herrich-Schäffer, 1855 – szalmaszínű aprómoly

Heliozelidae – Fényesszárnyú-molylepkéfélék

Antispila treitschkiella (F. von R., 1843) – somaknázó fényesmoly

Adelidae – Hosszúcsápú-törösmolyfélék

Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) – pompás törösmoly

Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) – nagy bajszosmoly

Incurvariidae – Ércfényű-virágomolyfélék

Incurvaria mascullella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tölgyaknázó virágomoly

I. oehlmanniella (Hübner, 1796) – áfonyás virágomoly

Tischeriidae – Foltaknás-sörtésmolyfélék

Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) – tölgyaknázó sörtésmoly

T. dodonaea Stainton, 1858 – sárga sörtésmoly

Emmetia marginea (Haworth, 1828) – szederaknázó sörtésmoly

E. gaunacella (Duponchel, 1843) – kökényaknázó sörtésmoly

Tineidae – Ruhamolyfélék

Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839 – díszes hulladékmoly

Reisserita relicinella (Herrich-Schäffer, 1853) – barna hulladékmoly

Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851) – fehérfejű zuzmómoly

Stenoptinea cyaneimarmorella (Millière, 1854) – tűszárnyú zuzmómoly

Morophaga choragella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – közönséges óriásmoly

Triaxomera parasitella (Hübner, 1796) – tarka gombamoly

Nemapogon granella (Linnaeus, 1758) – raktári gabonamoly

N. cloacella (Haworth, 1828) – raktári gombamoly

N. hungaricus Gozmány, 1960 – magyar gombamoly

Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867) – magyarmoly

Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758) – takácsmoly

Tineola bisselliella (Hummel, 1823) – ruhamoly

Tinea pellionella Linnaeus, 1758 – szűcsmoly

T. trinotella Thunberg, 1794 – hárompettyes fészekmoly

Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758) – pettyes fészekmoly

Monopis laevigella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hulladékmoly

M. obviella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – közönséges ablakosmoly

M. imella (Hübner, 1813) – szarurágó ablakosmoly

M. monachella (Hübner, 1796) – apácámoly

Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) – fésűscsápú korhadékmoly

Lypusidae – Zsákosmolyfélék

**Lypusa maurella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – mórlepke

Psychidae – Csőzsákosmolyfélék

Praesolenobia clathrella (F. von R., 1837) – hordós csővesmoly

Taleporia politella Ochseneheimer, 1816 – sárga csővesmoly

Psyche casta (Pallas, 1767) – fényes zsákhordólepke

Bijugis bombycella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – alkonyati zsákhordólepke

Rebelia herrichiella Strand, 1912 – őszi zsákhordólepke

Canephora hirsuta (Poda, 1761) – kormos zsákhordólepke

Pachytelia villosella (Ochseneheimer, 1810) – nagy zsákhordólepke

Megalophanes viciella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – útszéli zsákhordólepke

Apterona helicoidella (Vallot, 1827) – csigahéjas zsákhordólepke

Bucculatricidae – Szemtakarós-bordásmolyfélék

Bucculatrix ulmella Zeller, 1848 – erdei bordásmoly

B. thoracella (Thunberg, 1794) – hársaknázó bordásmoly

B. albedinella (Zeller, 1839) – szilaknázó bordásmoly

Gracillariidae – Keskenyszárnyú-molylepkéfélék

Parectopa robiniella Clemens, 1863 – akáclevélhólyagomoly

- Micrurapteryx kollariella* (Zeller, 1839) – zánótaknázó hóllyagosmoly
- Caloptilia elongella* (Linnaeus, 1761) – égerrágó keskenymoly
- C. roscipennella* (Hübner, 1796) – diógöngyölő keskenymoly
- C. fidella* (Reutti, 1853) – komlógöngyölő keskenymoly
- C. hemidactylella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – juhargöngyölő keskenymoly
- C. alchimiella* (Scopoli, 1763) – tölgygöngyölő keskenymoly
- C. stigmatella* (Fabricius, 1781) – füzgöngyölő keskenymoly
- C. azaleella* (Brants, 1913) – havasszépe-keskenymoly
- C. semifascia* (Haworth, 1828) – mezeijuhar-keskenymoly
- Gracillaria loriolella* (Frey, 1881) – északi keskenymoly
- G. syringella* (Fabricius, 1794) – orgona-keskenymoly
- Aspilapterix limosella* (Duponchel, 1843) – hangyabogács-keskenymoly
- A. tringipennella* (Zeller, 1839) – útifű-keskenymoly
- Eucalybites auroguttella* (Stephens, 1835) – orbáncfű-keskenymoly
- Calybites phasianipennella* (Hübner, 1813) – lóromaknázó keskenymoly
- C. quadrisignella* (Zeller, 1839) – bengeaknázó keskenymoly
- Acrocercops brongniardella* (Fabricius, 1798) – tölgyaknázó keskenymoly
- Leucospilapterix omissella* (Stainton, 1848) – ürömaknázó hóllyagosmoly
- Ornixola caudulatella* (Zeller, 1839) – farkos keskenymoly
- Callisto denticulella* (Thunberg, 1794) – almalevél-hóllyagosmoly
- Parornix anglicella* (Stainton, 1850) – galagonya-keskenymoly
- P. anguliferella* (Zeller, 1847) – körteráncoló keskenymoly
- Phyllonorycter corylifoliella* (Hübner, 1796) – almalevél-sátorosmoly
- P. messaniella* (Zeller, 1846) – gesztenye sátorosmoly
- P. quercifoliella* (Zeller, 1839) – közönséges sátorosmoly
- P. ulmifoliella* (Hübner, 1817) – nyírlevél-sátorosmoly
- P. tristrigella* (Haworth, 1828) – háromsávós sátorosmoly
- P. scabiosella* Douglas, 1853 – ördögsemm-sátorosmoly
- P. oxyacanthae* (Frey, 1856) – kökénylevél-sátorosmoly
- P. blancardella* (Fabricius, 1794) – almalevélaknázó sátorosmoly
- P. kleemannella* (Fabricius, 1781) – láperdei sátorosmoly
- P. maestingella* (Müller, 1764) – bükklevél-sátorosmoly
- P. issikii* (Kumata, 1963) – hárslevél-sátorosmoly
- P. roboris* (Zeller, 1839) – tölgyaknázó sátorosmoly
- P. abrasella* (Duponchel, 1843) – cseraknázó sátorosmoly
- P. emberizaepennella* (Bousche, 1834) – loncakanázó sátorosmoly
- P. acerifoliella* (Zeller, 1839) – juharaknázó sátorosmoly
- P. robiniella* (Clemens, 1859) – akáclevél-sátorosmoly
- Cameraria ohridella* Deschka et Dimic, 1986 – vadgesztenye-sátorosmoly
- Yponomeutidae** – Pókhálós molyfélék
- Scythropia crataegella* (Linnaeus, 1767) – pókhálós gyümölcsfamoly
- Yponomeuta evonymella* (Linnaeus, 1758) – pókhálós májusfamoly
- Y. rorrella* (Hübner, 1796) – pókhálós füzamoly
- Y. irrorella* (Hübner, 1796) – pókhálós kökénymoly
- Y. malinella* Zeller, 1838 – pókhálós almamoly
- Y. plumbella* ([Den. et Schiff.], 1775) – pókhálós bengemoly
- Y. sedella* Treitschke, 1832 – húszpettyes pókhálós moly
- Pseudoswammerdamia combinella* (Hübner, 1786) – szemfoltos tarkamoly
- Swammerdamia pyrella* (Villers, 1789) – almalevél-tarkamoly
- S. compunctella* (Herrich-Schäffer, 1855) – berkenyefonó tarkamoly
- Paraswammerdamia albicapitella* (Scharfenberg, 1805) – kökényfonó tarkamoly
- Cedestis gysselella* Zeller, 1839 – hamvas fenyőtűmoly
- C. subfasciella* (Stephens, 1834) – szürke fenyőtűmoly
- Niphonympha albella* (Zeller, 1847) – aranyfoltos havasmoly
- Prays ruficeps* (Heinemann, 1854) – havasi égermoly
- P. fraxinella* (Bjerkander, 1784) – égertrügymoly
- Argyresthia abdominalis* Zeller, 1839 – borókatű-aranyamoly
- A. trifasciata* Staudinger, 1871 – háromsávós boróka-ezüstmoly
- A. goedartella* (Linnaeus, 1758) – égerbarka-aranyamoly
- A. retinella* Zeller, 1839 – nyírfahajtás-aranyamoly
- A. spinosella* Stainton, 1849 – kökényvirág-aranyamoly
- A. bonnetella* (Linnaeus, 1758) – galagonyafűró aranyamoly
- Ypsolophidae** – Ívelt szárnyú-tarkamolyfélék
- Ypsolopha scabrella* (Linnaeus, 1761) – körtelevél-tarkamoly
- Y. horridella* (Treitschke, 1835) – kormos tarkamoly
- Y. lucella* (Fabricius, 1775) – tölgyfonó tarkamoly
- Y. persicella* (Fabricius, 1787) – őszibarack-tarkamoly

- Ypsolopha alpella* ([Den. et Schiff.], 1775) – okkersárga tarkamoly
- Y. sylvestra* (Linnaeus, 1767) – erdei tarkamoly
- Y. ustella* (Clerck, 1759) – csíkos tarkamoly
- Y. sequella* (Clerck, 1759) – ligeti tarkamoly
- Y. vittella* (Linnaeus, 1758) – füstös tarkamoly
- Y. chazariella* (Mann, 1866) – juharfonó tarkamoly
- Plutellidae** – Tarkamolyfélék
- Plutella xylostella* (Linnaeus, 1758) – káposztamoly
- Eidophasia messingiella* (Fischer von Röslerstamm, 1842) – kakukk-tormamoly
- Rhigognostis hufnagelii* (Zeller, 1859) – keresztes tarkamoly
- Acrolepiidae** – Hegyesszárnyú tarkamolyfélék
- Digitivalva pulicariae* (Klimesch, 1956) – homályos tarkamoly
- Acrolepiopsis assectella* (Zeller, 1839) – hagymarágó-tarkamoly
- Glyphipterigidae** – Szakállasmolyfélék
- Orthotelia sparganella* (Thunberg, 1788) – békabuzogánymoly
- Bedelliidae** – Szulákmolyfélék
- Bedellia somnulentella* (Zeller, 1847) – közönséges szulákmoly
- Lyonetiidae** – Ezüstös-fehérynárfélék
- Leucoptera malifoliella* (Costa, 1836) – lombosfalakó fehér-moly
- Lyonetia prunifoliella* (Hübner, 1796) – rózsalevélezüst-moly
- Ethmiidae** – Feketemolyfélék
- Ethmia decedea* (Haworth, 1828) – tízpettyes feketemoly
- E. quadrillemella* (Goeze, 1783) – gyászos feketemoly
- E. candidella* (Alphéraky, 1908) – őszi feketemoly
- E. pusilla* (Linnaeus, 1758) – díszes feketemoly
- E. terminella* (Fletcher, 1938) – hatpettyes feketemoly
- E. bipunctella* (Fabricius, 1775) – kétpettyes feketemoly
- E. haemorrhoidella* (Eversmann, 1844) – hullámos feketemoly
- Depressariidae** – Laposmolyfélék
- Semioscopis avellanella* (Hübner, 1793) – mogorósszövő laposmoly
- S. steinkellneriana* ([Den. et Schiff.], 1775) – levélszövő laposmoly
- Luquetia lotella* ([Den. et Schiff.], 1775) – kökényszövő laposmoly
- Exaeretia preisseckeri* (Rebel, 1937) – molyhostölgyes-laposmoly
- Agonopterix dispersella* (Kollar, 1832) – sárgarépalaposmoly
- A. ciliella* (Stainton, 1849) – nagy laposmoly
- A. assimilella* (Treitschke, 1832) – seprőzanót-laposmoly
- A. propinquella* (Treitschke, 1833) – aszatmoly
- A. arenella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ördög-szem-laposmoly
- A. curvipunctosa* (Haworth, 1811) – hamvasvörös laposmoly
- A. yeatiana* (Fabricius, 1781) – köményszövő laposmoly
- A. alstroemeriana* (Clerck, 1759) – bürökmoly
- A. purpurea* (Haworth, 1811) – bíborszínű laposmoly
- A. heracliana* (Linnaeus, 1758) – közönséges laposmoly
- A. oinochroa* (Turati, 1879) – kocsord-laposmoly
- A. hippomarathri* (Nickerl, 1864) – gurgolyalaposmoly
- A. furvella* (Treitschke, 1832) – ezerjófű-laposmoly
- A. pallorella* (Zeller, 1839) – sápadt laposmoly
- A. kaekeritziana* (Linnaeus, 1767) – mézszínű laposmoly
- A. nervosa* (Haworth, 1811) – okkerszínű laposmoly
- Depressaria pastinacella* (Duponchel, 1838) – medvetalp-laposmoly
- D. marcella* (Rebel, 1901) – csillogó laposmoly
- D. depressana* (Fabricius, 1775) – fakó laposmoly
- D. chaerophylli* (Zeller, 1839) – baraboly laposmoly
- D. pimpinellae* (Zeller, 1839) – földitömjén-laposmoly
- D. badiella* (Hübner, 1796) – pasztinák-laposmoly
- D. douglasella* (Stainton, 1849) – sárgarépa-moly
- D. albipunctella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fehérpettyes laposmoly
- D. olivella* (Zeller, 1854) – cickafark-laposmoly
- Elachistidae** – Fűaknázómolyfélék
- Elachista atricomella* (Stainton, 1849) – ebírmoly
- E. argentella* (Clerck, 1759) – ezüstfehér fűaknázómoly
- E. pollutella* (Duponchel, 1843) – balkáni fűaknázómoly
- E. spumella* (Caradja, 1920) – homoki fűaknázómoly
- E. pullicomella* (Zeller, 1834) – zabfűmoly
- E. adscitella* (Stainton, 1851) – barnás fűaknázómoly
- Dibrachia kalki* (Parenti, 1978) – fényes fűaknázómoly
- Agonoxenidae** – Lándzsás-tündérmolyfélék
- Blastodacna hellerella* (Duponchel, 1838) – galagonyarágó lándzsás-moly
- B. atra* (Haworth, 1828) – lándzsásszárnyú almamoly
- Tetanocentria ochraceella* (Rebel, 1903) – fényes lándzsás-moly
- Scythrididae** – Zöldszárnyú-molylepkefélék
- Scythris vittella* (Costa, 1836) – fehérécsikos zöldmoly
- S. limbella* (Fabricius, 1775) – parajfonó zöldmoly
- S. buszkoi* (Baran, 2003) – ördögcérma zöldmoly
- Chimabachidae** – Tavaszimolyfélék
- Diurnea fagella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szürke tavaszimoly
- D. lipsiella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – téli-moly
- Oecophoridae** – Díszmolyfélék
- Fabiola pokornyi* (Nickerl, 1864) – ezüstsíkos díszmoly

- Schiffermuelleria schaefferella* (Linnaeus, 1758) – ólomcsíkos díszmoly
- Decantha borkhauseni* (Zeller, 1839) – aranyfoltos díszmoly
- Metalampra cinnamomea* (Zeller, 1839) – fahéjbarna díszmoly
- M. diminutella* Rebel, 1932 – molyhostölgyes-díszmoly
- Borkhausenia minutella* (Linnaeus, 1758) – ikerpettyes díszmoly
- Crassa unitella* (Hübner, 1746) – aranybarna díszmoly
- Batia lambdella* (Donovan, 1793) – osztrák díszmoly
- B. internella* (Jäckh, 1972) – apró díszmoly
- Epicallima formosella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kéreglakó díszmoly
- Esperia oliviella* (Fabricius, 1794) – fekete díszmoly
- Oecophora bractella* (Linnaeus, 1758) – kis díszmoly
- Carcina quercana* (Fabricius, 1775) – vastagsápú díszmoly
- Minetia crinitus* (Fabricius, 1798) – fehér csíkosmoly
- Pleurota marginella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – barnasávcsíkosmoly
- Pleurota pyropella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tűzes csíkosmoly
- P. malatya* Back, 1973 – déli csíkosmoly
- P. aristella* (Linnaeus, 1767) – ezüstsávcsíkosmoly
- Holoscolia huebneri* Kocak, 1980 – sarlósszárnyú csíkosmoly
- Cephalispheira ferrugella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rozsdamintás díszmoly
- Lecithoceridae** – Hindumolyfélék
- Homaloxestis briantiella* (Turati, 1879) – nagy hindumoly
- Lecithocera nigrana* (Duponchel, 1836) – kis hindumoly
- Odites kollarella* (Costa, 1836) – árvamoly
- Coleophoridae** – Zsákhordómolyfélék
- Coleophora albella* (Thunberg, 1788) – fehércsíkos zsákosmoly
- C. trifolii* (Curtis, 1832) – lóhere zsákosmoly
- C. alcyonipennella* (Kollar, 1832) – bogáncsrágó zsákosmoly
- C. conyzae* Zeller, 1868 – bolhafűzsákosmoly
- C. lineolea* (Haworth, 1828) – árvacsalán-zsákosmoly
- C. hemerobiella* (Scopoli, 1763) – gyümölcsfalevél-zsákosmoly
- C. trifariella* Zeller, 1849 – zanótaknázó zsákosmoly
- C. discordella* Zeller, 1849 – bársonykerep-zsákosmoly
- C. ballotella* (Fischer von Röslerstamm, 1839) – tisztesfűzsákosmoly
- C. virgatella* Zeller, 1849 – zsályarágó zsákosmoly
- C. serpyllitorum* Hering, 1889 – kakukkfűaknázó zsákosmoly
- C. stramentella* Zeller, 1849 – síksági zsákosmoly
- C. coronillae* Zeller, 1849 – ledneklakó zsákosmoly
- C. vibicigerella* Zeller, 1839 – mezeiüröm-zsákosmoly
- C. ditella* Zeller, 1849 – margitvirág-zsákosmoly
- C. vibicella* (Hübner, 1813) – galajrágó zsákosmoly
- C. vicinella* Zeller, 1849 – kecskeruta-zsákosmoly
- C. ochrea* (Haworth, 1828) – ezüstcsíkos zsákosmoly
- C. lixella* Zeller, 1849 – fűaknázó zsákosmoly
- C. ornatipennella* (Hübner, 1796) – fűvönélő zsákosmoly
- C. oriolella* Zeller, 1849 – koronafűrt-zsákosmoly
- C. vulnerariae* Zeller, 1839 – nyúlherezsákosmoly
- C. hartigi* Toll, 1944 – Hartig-zsákosmolya
- C. halophilella* Zimmermann, 1926 – szikréti zsákosmoly
- C. therinella* Tengström, 1848 – asztrágó zsákosmoly
- C. linosyris* Hering, 1937 – aranyfűrt zsákosmoly
- C. versurella* Zeller, 1849 – labodatermés-zsákosmoly
- C. vestianella* (Linnaeus, 1758) – sirálytollú zsákosmoly
- C. trochilella* (Duponchel, 1843) – fészkesviráglakó zsákosmoly
- C. pseudorepentis* Toll, 1960 – homokháti zsákosmoly
- C. adpersella* Benander, 1939 – libatoprágó zsákosmoly
- C. binotapennella* (Duponchel, 1843) – kétpettyes zsákosmoly
- C. squalorella* Zeller, 1849 – mocskos zsákosmoly
- C. paripennella* Zeller, 1839 – vonalkás zsákosmoly
- C. unipunctella* Zeller, 1849 – feketepettyes zsákosmoly
- C. wockeella* Zeller, 1849 – nagy zsákosmoly
- C. trientella* Christoph, 1872 – homoki zsákosmoly
- C. onopordiella* Zeller, 1849 – számbogáncs-zsákosmoly
- Momphidae** – Lándzsásszárnyú-molyfélék
- Mompha miscella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – napvirágfűró lándzsászmoly
- M. ochraceella* (Curtis, 1839) – okkerszínű lándzsászmoly
- M. epilobiella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – agyagsárga lándzsászmoly
- M. divisella* (Herrich-Schäffer, 1854) – fűzikefűró lándzsászmoly
- M. bradleyi* Riedl, 1965 – angol lándzsászmoly
- Blastobasidae** – Avarevómolyfélék
- Blastobasis phycidella* (Zeller, 1839) – közönséges avarevómoly
- B. huemeri* Sinev, 1993 – erdei avarmoly
- Hypatopa inunctella* (Zeller, 1839) – barna avarevómoly
- Pterolonchidae** – Rétimolyfélék
- Pterolonche dispersa* Staudinger, 1859 – barna rétimoly
- Autostichidae** – Avarmolyfélék
- Oegoconia caradjai* Popescu-Gorj et Capuse, 1965 – fátyolos avarmoly
- O. uralaskella* Popescu-Gorj et Capuse, 1965 – közönséges avarmoly

- Apatema mediopallidum* Walsingham, 1900 – fehérsávos avarmoly
- A. whalleyi* Popescu-Gorj et Capuse, 1965 – erdélyi avarmoly
- Donaspastus pannonicus* Gozmány, 1952 – magyar avarmoly
- Amphisbatidae** – Erdei-díszmolyfélék
- Pseudatemelia flavifrontella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – avarlakó díszmoly
- Hypercallia citrinalis* (Scopoli, 1763) – pirossávos díszmoly
- Anchinia laureolella* Herrich-Schäffer, 1854 – henyeboroszlánmoly
- Cosmopterigidae** – Tündérmolyfélék
- Sorhagenia rhamniella* (Zeller, 1839) – bengefűró tündérmoly
- S. lophyrella* (Douglas, 1846) – közép-európai tündérmoly
- Pancalia leuwenhoekella* (Linnaeus, 1761) – fekete-csápú ibolyamoly
- Eteobalea anonymella* (Riedl, 1965) – névtelen tündérmoly
- E. gronoviella* (Scopoli, 1772) – gyűjtőványfű-tündérmoly
- E. tririvella* (Staudinger, 1870) – homoki tündérmoly
- Linnaecia phragmitella* Stainton, 1851 – nádmoly
- Pyroderces argyrogrammos* (Zeller, 1847) – ezüstmin-tás tündérmoly
- P. klimeschi* Rebel, 1938 – mocsári tündérmoly
- Cosmopterix zieglereella* (Hübner, 1810) – komlóaknázó tündérmoly
- C. scribaiella* Zeller, 1850 – levantei tündérmoly
- Gelechiidae** – Sarlósajkú-molyfélék
- Caulastrocecis furfurella* (Staudinger, 1871) – budai sarlós-moly
- Megacraspedus dolosellus* Zeller, 1839 – fűvönélő kopármoly
- M. separatellus* (Fisher von Röslerstamm, 1843) – apró kopármoly
- M. binotella* (Duponchel, 1843) – kétpettyes kopármoly
- M. imparellus* (Fisher von Röslerstamm, 1843) – balkáni törpemoly
- Chilopselaphus balneariellus* Chrétien, 1907 – dunántúli kopármoly
- Aristotelia decoratella* (Staudinger, 1879) – díszes sarlós-moly
- A. decurtella* (Hübner, 1813) – seprősajkú sarlós-moly
- A. subericinella* (Duponchel, 1843) – sárgacsíkos sarlós-moly
- A. subdecurtella* (Stainton, 1858) – fűzényhajtás-sarlós-moly
- Chrysoesthia drurella* (Fabricius, 1775) – labodarágó sarlós-moly
- C. sexguttella* (Thunberg, 1794) – aranyfoltos sarlós-moly
- Atremaea lonchoptera* Staudinger, 1871 – magyar nád-moly
- Isophrictis striatella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – varádcíslakó sarlós-moly
- Metzneria paucipunctella* (Zeller, 1839) – pipitérmoly
- M. neuropterella* (Zeller, 1839) – barnarácsos sarlós-moly
- M. aestivella* (Zeller, 1839) – bábakalács-sarlós-moly
- M. lappella* (Linnaeus, 1758) – bojtortjánmag-sarlós-moly
- M. metzneriella* (Stainton, 1851) – imolamag-sarlós-moly
- M. aprilella* (Herrich-Schäffer, 1854) – tűzesszárný sarlós-moly
- M. tristella* Rebel, 1901 – ólomszínű sarlós-moly
- Apodia bifractella* (Duponchel, 1843) – peremizsmag-sarlós-moly
- Ptocheuusa abnormella* (Herrich-Schäffer, 1854) – peremizsvirág-sarlós-moly
- Monochroa sepicolella* (Herrich-Schäffer, 1854) – karszterdei lápimoly
- M. lucidella* (Stephens, 1834) – sárgafoltos lápimoly
- M. divisella* (Douglas, 1850) – magyar lápimoly
- M. hornigi* (Staudinger, 1883) – keserűfű-lápimoly
- Eulamprotes wilkella* (Linnaeus, 1758) – ezüstcsíkos sarlós-moly
- E. atrella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – orbáncfű-sarlós-moly
- Recurvaria nanella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kis-vörös-rügysodró-moly
- R. leucatella* (Clerck, 1759) – nagy-vörös-rügysodró-moly
- Coleotechnites piceaella* (Kearfott, 1903) – fenyőtűborzasmoly
- Exoteleia dodecella* (Linnaeus, 1758) – fenyőrágóborszasmoly
- Stenolechia gemmella* (Linnaeus, 1758) – tölgyfűró sarlós-moly
- Parastenolechia nigrinotella* (Zeller, 1847) – szőlőrágóborszasmoly
- Stenolechiodes pseudogemmellus* Elsner, 1996 – molyhostölgyes-sarlós-moly
- Parachronistis albiceps* (Zeller, 1839) – mogyorórügy-sarlós-moly
- Teleiodes vulgella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – galagonya borszasmoly
- T. luculella* (Hübner, 1813) – u-betűs borszasmoly
- T. wagaie* (Nowicki, 1860) – szürke borszasmoly
- T. sequax* Haworth, 1828) – napvirág-borszasmoly
- Pseudotelphusa tessella* (Linnaeus, 1758) – sóska-famoly
- P. paripunctella* (Thunberg, 1794) – pontozott borszasmoly
- Teleiopsis diffinis* (Haworth, 1828) – juhsóska-sarlós-moly
- Altenia scriptella* (Hübner, 1796) – patkós borszasmoly

- Gelechia rhombella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – gyümölcslevélszövő sarlósmoly
- G. senticetella* (Staudinger, 1859) – borókalakó sarlósmoly
- G. sabinella* (Zeller, 1839) – borókarágó sarlósmoly
- G. muscosella* Zeller, 1839 – füzbarka-sarlósmoly
- G. nigra* (Haworth, 1828) – kormos sarlósmoly
- G. turpella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagy sarlósmoly
- G. sestertiella* Herrich-Schäffer, 1854 – talléros sarlósmoly
- Psoricoptera gibbosella* (Zeller, 1839) – levélsodró sarlósmoly
- Mirificarma maculatella* (Hübner, 1796) – feketepetytyes sarlósmoly
- M. cytisella* (Treitschke, 1833) – zanótszövő sarlósmoly
- Chionodes electella* (Zeller, 1839) – fenyőragó örvösmoly
- C. distinctella* (Zeller, 1839) – ürömszövő örvösmoly
- Aroga velocella* (Duponchel, 1838) – sóskauszövő sarlósmoly
- A. flavicomella* (Zeller, 1839) – aranyfejű sarlósmoly
- Filatima spurcella* (Duponchel, 1843) – kökénymohasarlósmoly
- Prolita solutella* (Zeller, 1839) – galajszövő sarlósmoly
- Athrips nigricostella* (Duponchel, 1842) – lucernafonó sarlósmoly
- A. mouffetella* (Linnaeus, 1758) – lonclelét-sarlósmoly
- Scrobipalpa acuminatella* (Sircom, 1850) – aszatrágó sarlósmoly
- S. artemisiella* (Treitschke, 1833) – rozsdacsíkos sarlósmoly
- S. ocellatella* (Boyd, 1858) – répaaknázó sarlósmoly
- S. erichi* (Povolny, 1964) – hajnalalmoly
- Scrobipalpa tussilaginis* (Frey, 1867) – martilapusarlósmoly
- Ephysteris promptella* (Staudinger, 1859) – őszi sarlósmoly
- E. inustella* (Zeller, 1839) – bukkalakó sarlósmoly
- Cosmardia moritzella* (Treitschke, 1835) – mécsvirág-sarlósmoly
- Caryocolum vicinella* (Douglas, 1851) – kiskunsági sarlósmoly
- C. leucothoracellum* (Klimesch, 1953) – fehértorú sarlósmoly
- C. marmoreum* (Haworth, 1828) – márványos sarlósmoly
- C. leucomelanella* (Zeller, 1839) – barátságfü-sarlósmoly
- C. blandella* (Douglas, 1852) – feketesávcsillaghúrmoly
- C. blandulella* (Tutt, 1887) – apró csillaghúrmoly
- C. proximum* (Haworth, 1828) – feketefoltos csillaghúrmoly
- Sophronia consanguinella* Herrich-Schäffer, 1854 – mezeiüröm-sarlósmoly
- S. ascalis* Gozmány, 1951 – turjáni sarlósmoly
- S. illustrella* (Hübner, 1796) – tarka sarlósmoly
- S. humerella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kakukkfűszövő sarlósmoly
- S. sicariellus* (Zeller, 1839) – ürömfonó sarlósmoly
- Stomopterix deterrentella* (Zeller, 1847) – karszterdei övesmoly
- S. remissella* (Zeller, 1847) – ibolyafényű övesmoly
- S. hungaricella* Gozmány, 1957 – pannon övesmoly
- Syncopacma coronillella* (Treitschke, 1853) – koronafürt-övesmoly
- S. cinctella* (Clerck, 1759) – ferdesávú övesmoly
- S. taeniolella* (Zeller, 1839) – fonáksávú övesmoly
- S. wormiella* (Wolff, 1958) – kerep-övesmoly
- Aproaerema anthyllidella* (Hübner, 1813) – nyúlhere-övesmoly
- Anacampsis populella* (Clerck, 1759) – nyárfalevél-sarlósmoly
- A. timidella* (Wocke, 1887) – tölgysodró sarlósmoly
- A. scintillella* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – napvirág-sarlósmoly
- Mesophleps silacella* (Hübner, 1796) – tetemtoldó-sarlósmoly
- Crossobela trinitella* (Herrich-Schäffer, 1856) – sárgaviolamoly
- Anarsia lineatella* (Zeller, 1839) – barackragó sarlósmoly
- A. spartiella* (Schränk, 1802) – seprőzanótmoly
- Nothris verbascella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – okkersárga sarlósmoly
- N. lemniscella* (Zeller, 1839) – fehérvállú sarlósmoly
- Dichomeris marginella* (Fabricius, 1781) – fehérsávcsarlósmoly
- D. limosella* (Schläger, 1849) – lucernarágó sarlósmoly
- D. barbella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szakállas sarlósmoly
- D. rasilella* (Herrich-Schäffer, 1854) – szibériai sarlósmoly
- Acanthophila alacella* (Zeller, 1839) – zuzmórágó sarlósmoly
- Brachmia dimidiella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – citromkocsord-lápmoly
- Helcystogramma trianulella* (Herrich-Schäffer, 1854) – szuláksodró lápmoly
- H. lutatella* (Herrich-Schäffer, 1854) – nádtippan-lápmoly
- H. rufescens* (Haworth, 1828) – fűsodró lápmoly
- H. albinervis* Gerasimov, 1929 – fehérerű lápmoly
- H. arulensis* (Rebel, 1929) – ritka lápmoly
- Acompsia cinerella* (Clerck, 1759) – szürke sarlósmoly
- Pexicopia malvella* (Hübner, 1805) – mályvalevél-sarlósmoly
- Platyedra subcinerea* (Haworth, 1828) – sárgásszürke sarlósmoly

Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) – mezei gabona-moly

Limacodidae – Csigalepkéfélék

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) – kagylólepke

Zygaenidae – Csüngőlepkék

Rhagades pruni ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kökény-fémlepke

Jordanita budensis (Speyer et Speyer, 1858) – magyar fémlepke

J. globulariae (Hübner, 1793) – nagy fémlepke

Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808 – pettyes csüngőlepke

Z. loti ([Denis et Schiffermüller], 1775) – közönséges csüngőlepke

Z. filipebdulae (Linnaeus, 1758) – acélszínű csüngőlepke

Z. carniolica (Scopoli, 1763) – fehérgyűrűs csüngőlepke

Sesiidae – Szitkár-félék

Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) – lószunyog-szitkár

Cossidae – Farontólepkék

Cossus cossus (Linnaeus, 1758) – füzfarontólepke

Parahypopta caestrum (Hübner, 1808) – spárgalepke

Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) – fokhagymalepke

Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790) – nádfürólepke

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) – almafarontólepke

Tortricidae – Sodrómolyfélék

Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811) – turjáni sárgamoly

P. pulvillana (Herrich-Schäffer, 1851) – spárgaszár-fürómoly

Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811) – fakó sárgamoly

Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847) – sárgatövű fürómoly

P. manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839) – turjáni fürómoly

P. contractana (Zeller, 1847) – pipitérfürómoly

Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) – közönséges sárgamoly

A. largana (Rebel, 1906) – magyar sárgamoly

A. zoegana (Linnaeus, 1767) – barnacsíkos sárgamoly

Prochlidonia amiantana (Hübner, 1799) – fényes sárgamoly

Eupoecilia angustana (Hübner, 1799) – közönséges virágfürómoly

Aethes hartmanniana (Clerck, 1759) – ördög szemfürómoly

A. williana (Brahm, 1791) – gyopárfürómoly

A. margaritana (Haworth, 1811) – fényes fürómoly

A. rutilana (Hübner, 1817) – aranyló sárgamoly

A. smeathmanniana (Fabricius, 1781) – fészkesvirág-sárgamoly

A. tessera ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rácsos fürómoly

A. flagellana (Duponchel, 1836) – mezei sárgamoly

A. bilbaensis (Rössler, 1877) – csillámos sárgamoly

A. kindermanniana (Treitschke, 1830) – ürömvirág-sárgamoly

Cochylidia subroseana (Haworth, 1811) – rózsás fürómoly

C. moguntiana (Rössler, 1864) – mezei üröm-fürómoly

Diceratura ostrinana (Guenée, 1845) – bíborsávós fürómoly

Cochylis epilinana Duponchel, 1843 – lentokmoly

C. hybridella (Hübner, 1813) – keserűgyökér-fürómoly

C. dubitana (Hübner, 1799) – kis fürómoly

C. atricapitana Stephens, 1852 – mocsári fürómoly

C. posterana Zeller, 1847 – asztalvirág-moly

Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811) – mezei fürómoly

Tortrix viridana Linnaeus, 1758 – tölgyilonca

Aleimma loeflingianum (Linnaeus, 1758) – tölgylevél-sodrómoly

Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758) – rozsdarácsos levélmoly

Acleris forskaleana (Linnaeus, 1758) – juharos-levélmoly

A. holmiana (Linnaeus, 1758) – fehérfoltos levélmoly

A. rhombana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – cifra levélmoly

A. variegana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tarka levélmoly

A. hastiana (Linnaeus, 1758) – fűzfalevélmoly

A. aspersana (Hübner, 1817) – vérfű sodrómoly

A. permutana (Duponchel, 1836) – díszes levélmoly

A. ferrugana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rozsdás levélmoly

A. notana (Donovan, 1806) – nyírfa-levélmoly

A. kochiella (Goeze, 1783) – szürkés levélmoly

A. rufana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörhenyes levélmoly

Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799) – felhős sodrómoly

Doloploca punctulana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – lonclakó sodrómoly

Tortricodes alternella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tavaszi sodrómoly

Eana osseana (Scopoli, 1763) – csontszínű sodrómoly

Cnephasia incertana (Treitschke, 1835) – márványos sodrómoly

Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799) – réti sodrómoly

C. communana (Herrich-Schäffer, 1851) – közönséges sodrómoly

Sparganothis pilleriana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szőlőilonca

Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775) – ezüstmintás sodrómoly

Epagoge grotiana (Fabricius, 1781) – bokorerdei sodrómoly

- Paramesia gnomana* (Clerck, 1759) – okkerszínű sodró-moly
- Paraclepsis cinctana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – galériás sodró-moly
- Capua vulgana* (Frölich, 1828) – sárgásszürke sodró-moly
- Philedonides lunana* (Thunberg, 1784) – pimpószövő sodró-moly
- P. rhombicana* (Herrich-Schäffer, 1851) – rozsdasárga sodró-moly
- Archips podana* (Scopoli, 1763) – dudvarágó sodró-moly
- A. crataegana* (Hübner, 1799) – cseresznyeilonca
- A. xyloteana* (Linnaeus, 1758) – kökényszövő sodró-moly
- A. rosana* (Linnaeus, 1758) – rózsailonca
- Choristoneura hebenstreitella* (Müller, 1764) – mo-gyorós-sodró-moly
- Argyrotaenia ljunghiana* (Thunberg, 1797) – ékes sodró-moly
- Ptycholoma lecheara* (Linnaeus, 1758) – ezüstsávós sodró-moly
- Pandemis cerasana* (Hübner, 1796) – kerti sodró-moly
- P. heparana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ligeti sodró-moly
- P. dumetana* (Treitschke, 1835) – mocsári sodró-moly
- Syndemis musculana* (Hübner, 1799) – füstös sodró-moly
- Aphelia paleana* (Hübner, 1793) – sápadt sodró-moly
- A. ferrugana* (Hübner, 1793) – okkersárga sodró-moly
- A. viburnana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – parlagi sodró-moly
- Clepsis senecionana* (Hübner, 1819) – rozsdás sodró-moly
- C. rurinana* (Linnaeus, 1758) – fakó sodró-moly
- C. spectrana* (Treitschke, 1830) – szalmaszínű sodró-moly
- C. pallidana* (Fabricius, 1776) – aranyásárga sodró-moly
- C. consimilana* (Hübner, 1817) – fagyalsodró-moly
- Adoxophyes orana* (F. von R., 1834) – almailonca
- Isotrias hybridana* (Hübner, 1817) – cifra sodró-moly
- Bactra furfurana* (Haworth, 1811) – gyakori szittyó-moly
- B. lancealana* (Hübner, 1799) – lándzsás szittyó-moly
- B. robustana* (Christoph, 1872) – nagy szittyó-moly
- Apotomis capreana* (Hübner, 1817) – füzügyrágó tükrősmoly
- Endothenia oblongana* (Haworth, 1811) – héjakút-tükrősmoly
- E. quadrimaculana* (Haworth, 1811) – mocsári tükrősmoly
- E. nigricostana* (Haworth, 1811) – tisztessfü-tükrősmoly
- Eudemis profundana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fehérfoltos tükrősmoly
- Orthotaenia undulana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csalánsodró tükrősmoly
- Hedya salicella* (Linnaeus, 1758) – fehérhátú tükrősmoly
- H. nubiferana* Haworth, 1811 – rügysodró tükrősmoly
- H. pruniana* (Hübner, 1799) – szilvarügymoly
- Metendothenia atropunctana* (Zetterstedt, 1839) – pettyes tükrősmoly
- Celypha rufana* (Scopoli, 1763) – ürömfúró tükrősmoly
- C. striana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pity-pangfúró tükrősmoly
- C. flavipalpana* (Herrich-Schäffer, 1851) – öthorgú tükrősmoly
- C. cespitana* (Hübner, 1817) – mezei tükrősmoly
- Loxoterma rivulana* (Scopoli, 1763) – dudvasodró tükrősmoly
- L. lacunana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vízparti tükrősmoly
- L. doubledayana* (Barrett, 1872) – lápréti tükrősmoly
- Pristerognatha fuligana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bogáncsfúró tükrősmoly
- Olethreutes arcuella* (Clerck, 1759) – avarevő tükrősmoly
- Piniphila bifasciana* (Haworth, 1811) – tobozragó tükrősmoly
- Pseudohermenias abietana* (Fabricius, 1787) – fenyőtű-tükrősmoly
- Lobesia botrana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tarka szőlőmoly
- L. abscisana* (Doubleday, 1849) – meredeksávós tükrősmoly
- L. bicinctana* (Duponchel, 1844) – kétcsikú tükrősmoly
- L. artemisiana* (Zeller, 1847) – atracél-tükrősmoly
- Thiodia torridana* (Lederer, 1859) – fehéröves tükrősmoly
- T. citrana* (Hübner, 1799) – citromsárga tükrősmoly
- T. lerneana* (Treitschke, 1835) – piros tükrősmoly
- T. trochilana* (Frölich, 1828) – dárdahere-tükrősmoly
- Rhopobota stagnana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – horpadtsávú tükrősmoly
- Spilonota ocellana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szemes tükrősmoly
- Epinotia festivana* (Hübner, 1799) – barnatövű tükrősmoly
- E. nanana* (Treitschke, 1835) – fenyősovény-tükrősmoly
- E. demarniana* (Fischer von Röslerstamm, 1840) – barkaszövő tükrősmoly
- E. tenerana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nyírbarka-tükrősmoly
- E. teraquetrana* (Haworth, 1811) – nyírfúró tükrősmoly
- E. bilunana* (Haworth, 1811) – félholdas tükrősmoly
- E. nisella* (Clerck, 1759) – nyárfabarka-tükrősmoly
- Zeiraphera griseana* (Hübner, 1799) – fenyőtűszövő tükrősmoly
- Z. isertana* (Fabricius, 1794) – tölgysodró tükrősmoly

- Crociosema plebejana* Zeller, 1847 – déli tükrösmoly
Phaneta pauperana (Duponchel, 1843) – gyepűrőzsa-tükrösmoly
Pelochrista decolorana (Freyer, 1840) – fakó tükrösmoly
P. caecimaculana (Herrich-Schäffer, 1851) – vakfoltú tükrösmoly
P. mollitana (Zeller, 1847) – mediterrán tükrösmoly
P. modicana (Zeller, 1847) – sárgásszürke tükrösmoly
P. infidana (Hübner, 1824) – mezeiüröm-tükrösmoly
P. hepariana (Herrich-Schäffer, 1851) – májszínű tükrösmoly
Eucosma cana (Haworth, 1811) – aszatvirág-tükrösmoly
E. hohenwartiana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bogáncsvirág-tükrösmoly
E. parvulana (Wilkinson, 1859) – zsoldinavirág-tükrösmoly
E. balatonana (Osthelder, 1937) – dunántúli tükrösmoly
E. lacteana (Treitschke, 1835) – fehér tükrösmoly
E. albidulana (Herrich-Schäffer, 1851) – zsoldina tükrösmoly
E. metzneriana (Treitschke, 1830) – ürömggyökér-tükrösmoly
E. tundrana (Kennel, 1900) – tundramoly
E. conterminana (Herrich-Schäffer, 1851) – saláta-tükrösmoly
E. wimmerana (Treitschke, 1835) – ürömgubacs-tükrösmoly
E. lugubrana (Treitschke, 1830) – hagymarágó tükrösmoly
E. pupillana (Clerck, 1759) – aprószemű tükrösmoly
E. aspidiscana (Hübner, 1817) – aranyfürt-tükrösmoly
Epibactra sareptana (Herrich-Schäffer, 1861) – keleti szittyómoly
Gypsonoma minutana (Hübner, 1799) – fehérnyár-tükrösmoly
G. dealbana (Frölich, 1828) – barkarágó tükrösmoly
G. aceriana (Duponchel, 1843) – nyárfahajtás-tükrösmoly
Epiblema sticticana (Fabricius, 1794) – fehérpettyes tükrösmoly
E. scutulana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – réti tükrösmoly
E. foenella (Linnaeus, 1758) – kampósoltú tükrösmoly
E. junctana (Herrich-Schäffer, 1856) – turjáni tükrösmoly
E. graphana (Treitschke, 1835) – cickafark-tükrösmoly
E. similana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nyírlakó tükrösmoly
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) – rózsahajtás-tükrösmoly
N. uddmanniana (Linnaeus, 1758) – málnasodró tükrösmoly
N. incaranatana (Hübner, 1800) – jajrőzsa-tükrösmoly
N. trimaculana (Haworth, 1811) – galagonya-tükrösmoly
Blastethia turionella (Linnaeus, 1758) – rügyfűró gyantamoly
B. posticana (Zetterstedt, 1935) – erdeifenyő gyantamoly
Gravarmata margarotana (Heinemann, 1863) – márványos gyantamoly
Rhyacionia buoliana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fenyőilonca
R. pinicolana (Doubleday, 1849) – piros gyantamoly
R. hafneri (Rebel, 1837) – rácsos gyantamoly
R. pinivorana (Lienig et Zeller, 1846) – tarka gyantamoly
Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) – kéregmoly
Ancylis laetana (Fabricius, 1775) – fehér horgasmoly
A. obtusana (Haworth, 1811) – kutyabenge-horgasmoly
A. comptana (Frölich, 1828) – szamóca-horgasmoly
A. diminutana (Haworth, 1811) – apró horgasmoly
A. selenana (Guenée, 1845) – sötét horgasmoly
A. unculana (Haworth, 1811) – szedersodró horgasmoly
A. apicella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bengesodró horgasmoly
A. paludana (Barrett, 1871) – turjáni horgasmoly
A. badiana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bükkönysodró horgasmoly
A. achatana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – márványos horgasmoly
A. mitterbacheriana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tölgysodró horgasmoly
A. tineana (Hübner, 1799) – galagonyasodró horgasmoly
Cydia nigricana (Fabricius, 1794) – borsómoly
C. oxytropidis (Martini, 1912) – csajkavirágomoly
C. succedana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kerepmagmoly
C. microgrammana (Guenée, 1845) – iglice-magrágómoly
C. medicaginis (Kuznetsov, 1962) – lucerna-magrágómoly
C. duplicana (Zetterstedt, 1899) – barna fenyőkéregmoly
C. strobilella (Linnaeus, 1758) – fenyőhajtásomoly
C. pomonella (Linnaeus, 1758) – almamoly
Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947) – körtemoly
C. triangulella (Goeze, 1783) – tölgymakkmoly
C. fagiglandana (Zeller, 1841) – bükkmakkmoly
C. amplana (Hübner, 1799) – mogyorómoly
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) – orbáncfű-magrágómoly
Grapholita fissana (Frölich, 1828) – bükkönymagmoly
G. coronillana (Lienig et Zeller, 1846) – koronafürt-magrágómoly
G. gemmiferana (Treitschke, 1835) – lednekmagmoly

- Aspila funebrana* (Treitschke, 1835) – szilvamoly
A. janthinana (Duponchel, 1835) – galagonyabogyó-tükrösmoly
A. molesta (Busck, 1916) – keleti gyümölcsmoly
Pammene querceti (Gozmány, 1957) – magyar tölgy-makkmoly
P. fasciana (Linnaeus, 1761) – makkfűrómoly
P. splendulana (Guenée, 1845) – pompás tükrösmoly
P. insulana (Guenée, 1845) – tölgygubacsmoly
P. giganteana (Peyerimhoff, 1863) – tükrös gubacsmoly
P. gallicolana (Lienig et Zeller, 1846) – francia gubacsmoly
P. argyrana (Hübner, 1799) – feketeszegélyű gubacsmoly
P. rhediella (Clerck, 1759) – galagonya-magrágómoly
P. spiniana (Duponchel, 1843) – kékényvirág-tükrösmoly
Strophedra weirana (Douglas, 1850) – bükklevél-tükrösmoly
Dichrorampha acuminatana (Lienig et Zeller, 1846) – réti gyökérfűrómoly
D. simpliciana (Haworth, 1811) – feketeűröm-gyökérfűrómoly
D. gueneana Obratzsov, 1953 – aranysegélyű gyökérfűrómoly
D. heegerana (Duponchel, 1843) – barna gyökérfűrómoly
D. petiverella (Linnaeus, 1758) – közönséges gyökérfűrómoly
- Choreutidae** – Levélmolyfélék
Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794) – pompás levélmoly
Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851) – farkasalma-moly
- Epermeniidae** – Íveltszárnyú-molyfélék
Epermenia insecurella (Stainton, 1849) – ólomszínű íveltmoly
E. chaerophyllella (Goeze, 1783) – barabolysodró íveltmoly
E. pontificella (Hübner, 1796) – tarka íveltmoly
E. petrusella Heylaerts, 1883) – buglyoskocsordfonó íveltmoly
Ochromolopis icetella (Hübner, 1813) – zsellérke-íveltmoly
- Alucitidae** – Soktollúmolyfélék
Alucita grammodactyla Zeller, 1841 – ördög szem-soktollúmoly
- Pterophoridae** – Tollasmolyfélék
Agdistis adactyla (Hübner, 1823) – közönséges egytollúmoly
Platyptilia tetradactyla (Linnaeus, 1761) – okkersárga tollasmoly
Cnaemidophorus rhododactyla ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rózsabogyó tollasmoly
- Crombrugghia tristis* (Zeller, 1841) – gyászos tollasmoly
C. distans (Zeller, 1847) – rozsdabarna tollasmoly
Capperia celeusi Frey, 1886 – gamandor-tollasmoly
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758) – fehér tollasmoly
P. ischnodactyla (Treitschke, 1833) – szulák-tollasmoly
Calyciphora nephelodactyla (Eversmann, 1844) – sötét tollasmoly
Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758) – sárgásbarna tollasmoly
Wheeleria obsoleta (Zeller, 1841) – pemetefű-tollasmoly
Oidematophorus constanti (Ragonot, 1875) – pere-mizsrágó tollasmoly
Ovendenia lienigiana (Zeller, 1852) – ürömszövő tollasmoly
Adaina microdactyla (Hübner, 1813) – sédkender-tollasmoly
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) – közönséges tollasmoly
E. argoteles (Meyrick, 1922) – illír tollasmoly
- Carposinidae** – Bogyórágómolyfélék
Carposina scirrhosella Herrich-Schäffer, 1853 – közönséges csipkebogyómoly
- Pyralidae** – Fényiloncafélék
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) – méhviaszmoly
Melissoblastes zelleri Joannis, 1932 – koldusmoly
Lamoria anella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – törmelék-moly
Galleria mellonella (Linnaeus 1758) – nagy viasz-moly
Synagpe punctalis (Fabricius, 1775) – hosszúlábú fényilonca
Pyralis farinalis Linnaeus, 1758 – lisztilonca
P. perversalis (Herrich-Schäffer, 1849) – pusztai fényilonca
P. regalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pompás fényilonca
Actenia brunnealis (Treitschke, 1829) – barna fényilonca
A. honestalis (Treitschke, 1829) – karsztlakó fényilonca
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) – szénailonca
Herculia incarnatalis (Zeller, 1847) – piros fényilonca
H. rubidalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörös fényilonca
Orthopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) – rezes fényilonca
Endotricha flammealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tűzesszárnyú fényilonca
Trachonitis cristella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bokorrágó karcsúmoly
Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849) – fűfonó karcsúmoly
Elegia similella Zincken, 1818) – tölgyfűrő karcsúmoly

- Pempeliella ornatella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – diszes karcsúmoly
- P. dilutella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kakukkfű-karcsúmoly
- Khorassania compositella* (Treitschke, 1835) – ürömlevél-karcsúmoly
- Sciota fumella* (Eversmann, 1844) – hideglápi karcsúmoly
- S. rhenella* (Zincken, 1818) – alföldi karcsúmoly
- Selagia argyrella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ezüstös karcsúmoly
- Selagia spadicella* (Hübner, 1796) – kékfényű karcsúmoly
- Etiella zinckenella* (Treitschke, 1832) – akác-moly
- Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763) – lucernamoly
- Laodamia faecella* (Zeller, 1839) – keresztcsávós karcsúmoly
- Pempelia formosa* (Haworth, 1811) – ékes karcsúmoly
- P. palumbella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hamvas karcsúmoly
- Psorosa dahliella* (Treitschke, 1832) – sárgacsíkos karcsúmoly
- Dioryctria sylvestrella* (Ratzeburg, 1840) – tobozragó karcsúmoly
- D. simplicella* Heinemann, 1863 – fenyőszövő karcsúmoly
- D. abietella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fenyőragó karcsúmoly
- Phycita meliella* Mann, 1864 – görög karcsúmoly
- P. roborella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tölgy-szövő karcsúmoly
- Hypochalcia decorella* (Hübner, 1817) – barna karcsúmoly
- H. ahenella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – óriás karcsúmoly
- Epischmia prodromella* (Hübner, 1796) – imolarágó karcsúmoly
- Nephopterix angustella* (Hübner, 1796) – kecskerágó karcsúmoly
- Conobathra tumidana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bordás karcsúmoly
- C. repandana* (Fabricius, 1798) – tarkamintás karcsúmoly
- Trachycera advenella* (Zincken, 1818) – gerleszínű karcsúmoly
- T. suavella* (Zincken, 1818) – karszterdei karcsúmoly
- T. legatea* (Haworth, 1811) – bengerágó karcsúmoly
- T. marmorea* (Haworth, 1811) – márványos karcsúmoly
- Acrobasis sodalella* Zeller, 1848 – tölgyfonó karcsúmoly
- A. consociella* (Hübner, 1813) – szalagos karcsúmoly
- A. glaucella* Staudinger, 1859 – hamvasfoltú karcsúmoly
- A. obtusella* (Hübner, 1796) – körtelevélfonó karcsúmoly
- Apomyelois bistriatella neophanes* (Durrant, 1915) – nyírfalakó karcsúmoly
- Episcythrastris tetricella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tavaszi karcsúmoly
- Eurhodope rosella* (Scopoli, 1763) – rózsaszínű karcsúmoly
- Myelois circumvoluta* (Geoffroy, 1785) – pettyes karcsúmoly
- Pterothrixidia rufella* (Duponchel, 1836) – vörös karcsúmoly
- Isauria dilucidella* (Duponchel, 1836) – sziki karcsúmoly
- Gymnancila hornigi* (Lederer, 1852) – magragó karcsúmoly
- Assara terebrella* (Zincken, 1818) – tobozrakó karcsúmoly
- Euzophera pinguis* (Haworth, 1811) – körislakó karcsúmoly
- E. bigella* (Zeller, 1848) – kétsíkós karcsúmoly
- E. cinerosella* (Zeller, 1839) – ürömfűró karcsúmoly
- Euzopherodes charlottae* (Rebel, 1914) – magyar karcsúmoly
- Nyctegretis lineana* (Scopoli, 1786) – agátszínű karcsúmoly
- N. triangulella* Ragonot, 1901 – háromszöges karcsúmoly
- Ancylosis cinnamomella* (Duponchel, 1836) – fahéjszínű karcsúmoly
- Homoeosoma sinuellum* (Fabricius, 1794) – agyagsárga karcsúmoly
- H. nebulella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – napraforgómoly
- H. subalbatellum* Mann, 1864 – őszi karcsúmoly
- H. nimbellum* (Duponchel, 1836) – apró karcsúmoly
- Phycitodes binaevella* (Hübner, 1813) – bogáncslakó karcsúmoly
- Vitula biviella* (Zeller, 1848) – fenyővirág-karcsúmoly
- Plodia interpunctella* (Hübner, 1813) – aszalványmoly
- Ephestia kuehniella* (Zeller, 1879) – lisztmoly
- E. elutella* (Hübner, 1796) – készletmoly
- E. furcatella* (Herrich-Schäffer, 1849) – trópusi gyümölcsmoly
- Anerastia lotella* (Hübner, 1813) – gabonarágó karcsúmoly
- Hypsotropa unipunctella* (Ragonot, 1887) – sztyeppéretti karcsúmoly
- Ematheudes punctella* (Treitschke, 1833) – kúposfejű karcsúmoly
- Scoparia luteolaris* (Scopoli, 1772) – sárga mohailonca
- S. basistrigalis* Knaggs, 1866 – tarka mohailonca
- S. ancipitella* (La Harpe, 1855) – apró mohailonca
- S. pyralella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hamvas mohailonca
- Gesneria centuriella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagy zuzmóilonca
- Witlesia pallida* (Curtis, 1827) – mocsári mohailonca

- Heliothela wulfeniana* (Scopoli, 1763) – fényes kormosmoly
- Euchromius ocella* (Haworth, 1811) – ezüstcsíkos mozaikmoly
- E. bellus* (Hübner, 1796) – cifra mozaikmoly
- Chilo suppressalis* Walker, 1863 – egyszínű nádfürómoly
- C. phragmitella* (Hübner, 1810) – csíkos nádfürómoly
- Calamatropha paludella* (Hübner, 1824) – barna nádlevélmoly
- C. aureliella* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – arany színű nádlevélmoly
- Chrysoteuchia culme/la* (Linnaeus, 1758) – kerti fűgyökérmoly
- Crambus pascuella* (Linnaeus, 1758) – lápréti fűgyökérmoly
- C. pratella* (Linnaeus, 1758) – ékes fűgyökérmoly
- C. perlella* (Scopoli, 1763) – gyöngyházás fűgyökérmoly
- Agriphila tristella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – gyászos fűgyökérmoly
- A. inquinatella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – közönséges fűgyökérmoly
- A. selasella* (Hübner, 1813) – fakó fűgyökérmoly
- A. poliella* (Treitschke, 1832) – okkerszínű fűgyökérmoly
- A. geniculea* (Haworth, 1811) – parlagi fűgyökérmoly
- A. tolli* (Bleszinsky, 1952) – karszterdei fűgyökérmoly
- Catoptria pinella* (Linnaeus, 1758) – ezüstös fűgyökérmoly
- C. mytilella* (Hübner, 1805) – fehércsíkos fűgyökérmoly
- C. falsella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hálós fűgyökérmoly
- C. verella* (Zincken, 1817) – kormos fűgyökérmoly
- C. lythargyrella* (Hübner, 1796) – szalmaszárga fűgyökérmoly
- Xanthocrambus saxonellus* (Zincken, 1821) – sárga fűgyökérmoly
- X. lucellus* (Herrich-Schäffer, 1848) – zegzugos fűgyökérmoly
- Chrysocrambus linetellus* (Fabricius, 1781) – déli fűgyökérmoly
- C. craterella* (Scopoli, 1763) – rácsos fűgyökérmoly
- Thisanotia chrysonuchella* (Scopoli, 1763) – tavaszi fűgyökérmoly
- Pediasia fascinelina* (Hübner, 1813) – sávós fűgyökérmoly
- P. luteella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – agyagsárga fűgyökérmoly
- P. contaminella* (Hübner, 1796) – mocskos fűgyökérmoly
- P. aridella* (Thunberg, 1788) – sziki fűgyökérmoly
- Platyles cerussella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – törpe fűgyökérmoly
- P. alpinella* (Hübner, 1813) – moharágómoly
- Schoenobius gigantella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – óriás nádfürómoly
- Donacaula forficella* (Thunberg, 1794) – fakó nádfürómoly
- D. mucronella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ritka nádfürómoly
- Elophila nymphaeata* (Linnaeus, 1758) – tarka vízimoly
- Cataclysta lemnata* (Linnaeus, 1758) – békalencse-moly
- Parapoynx stratiotatum* (Linnaeus, 1758) – közönséges vízimoly
- Aporodes floralis* (Hübner, 1809) – articsókaevő tűzmoly
- Cynaeda dentalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – gyakori ciframoly
- Epacestria pustulalis* (Hübner, 1823) – atracélrágó tűzmoly
- Evergestis frumentalis* (Linnaeus, 1761) – tavaszi dudvamoly
- E. forficalis* (Linnaeus, 1758) – veteménymoly
- E. extimalis* (Scopoli, 1763) – kerti dudvamoly
- E. limbata* (Linnaeus, 1767) – közönséges dudvamoly
- E. pallidata* (Hufnagel, 1769) – szalmaszínű dudvamoly
- E. politalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pompás dudvamoly
- E. aenealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – patinás dudvamoly
- Hellula undalis* (Fabricius, 1775) – zegzugos tűzmoly
- Udea ferrugalis* (Hübner, 1796) – rozsdabarna tűzmoly
- U. fulvalis* (Hübner, 1809) – hullámos tűzmoly
- U. lutealis* (Hübner, 1809) – sárgás tűzmoly
- U. accolalis* (Zeller, 1867) – lápréti tűzmoly
- Paracorsia repandalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szalmaszínű tűzmoly
- Loxostege turbidalis* (Treitschke, 1829) – ürömrágó tűzmoly
- L. sticticalis* (Linnaeus, 1761) – muszkamoly
- Ecpyrrhorhoe rubiginalis* (Hübner, 1796) – rozsdavörös tűzmoly
- Pyrausta cingulata* (Linnaeus, 1758) – fehéröves kormosmoly
- P. rectefascialis* Toll, 1936 – lengyel kormosmoly
- P. sanguinalis* (Linnaeus, 1767) – vérszínű bíbormoly
- P. despicata* (Scopoli, 1763) – réti bíbormoly
- P. aurata* (Scopoli, 1763) – aranyló bíbormoly
- P. purpuralis* (Linnaeus, 1758) – közönséges bíbormoly
- P. ostrinalis* (Hübner, 1796) – ritka bíbormoly
- P. nigrata* (Scopoli, 1763) – fehérpettyes kormosmoly
- Uresiphita gilvata* (Fabricius, 1794) – feketeöves dudvamoly
- Nascia ciliaris* (Hübner, 1796) – sásrágó tűzmoly
- Sitochroa palealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kén szárnyú dudvamoly

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) – világossárga dudvamoly
Perinephela lancealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hosszúsárnyú tűzmoly
Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767) – koronás dudvamoly
P. stachydalis (Zincken, 1821) – mocsári dudvamoly
P. perlucidalis (Hübner, 1809) – lápréti tűzmoly
Mutuaia terrealis (Treitschke, 1824) – barnásszürke tűzmoly
Psammotis pulveralis (Hübner, 1796) – rozsdássárga tűzmoly
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) – kukoricamoly
Euleia crocealis (Hübner, 1796) – okkersárnyú tűzmoly
Anania verbascalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – aranyzsinű dudvamoly
Eurrhpara hortulata (Linnaeus, 1758) – tarka csalánmoly

Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796) – üvegsárnyú tűzmoly
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) – csalánevő tűzmoly
Mecyna flavalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csalánszövő tűzmoly
M. trinalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tetemtoldótűzmoly
Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) – betűmintás tűzmoly
Palpita unionalis (Hübner, 1796) – hófehér tűzmoly
Dolicharthria punctalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hosszúlábú tűzmoly
Metasia ophialis (Treitschke, 1829) – kígyósávós tűzmoly
Nomophila noctuella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – közönséges vándormoly

EPÖL ÉS KÖRNYÉKE NAGYLEPKÉI (MACROLEPIDOPTERA)

Lasiocampidae – Szövőlepkék

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) – fenyőpohók
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) – sárga gyapjasszövő
E. lanestris (Linnaeus, 1758) – tavaszi gyapjasszövő
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) – tölgylevélpohók
Lasiocampa trifolii ([Denis et Schiffermüller], 1775) – lóhereszövő
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) – málnaszövő
Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) – kutyatejszövő
M. neustrium (Linnaeus, 1758) – gyűrűs szövő
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) – szilvafapohók
Phylodesma tremulifolia (Hübner, 1810) – nyárfalevélpohók

Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) – nyárfaszövő
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) – galagonyaszövő

Lemoniidae – Őszi szövk

Lemonia dumi (Linnaeus, 1758) – sávós pohók

Sphingidae – Szenderek

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) – folyófüszender
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) – fagyalszender
Lyoiacus pinastri (Linnaeus, 1758) – fenyőszender
Laotioe populi (Linnaeus, 1758) – nyárfaszender
Marumba quercus (Linnaeus, 1758) – tölgyzender
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) – hárszender
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) – esti pávaszemes szender

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) – kacsafarkú szender

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – törpeszender
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) – szőlőszender
D. porcellus (Linnaeus, 1758) – pirosszender
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) – kutyatejszender
H. gallii (Rottemburg, 1775) – galajszender
H. livornica (Esper, 1780 – sávosszender

Saturniidae – Pávaszemes szövk

* *Saturnia pavonia* (Linnaeus, 1758) – kis pávaszem
S. pyri ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagy pávaszem

Hesperidae – Busalepkék

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – cigány busalepke
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – kis busalepke

Papilionidae – Pillangófélék

Iphiclide podalirius (Linnaeus, 1758) – kardoslepke
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – fecskefarkú lepke

Pieridae – Fehérlepkék

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – fakó kéneslepke
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – citromlepke
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – kis mustárlepke
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – káposzta fehérlepke
P. napi (Linnaeus, 1758) – repce-fehérlepke
P. rapae (Linnaeus, 1758) – répa-fehérlepke
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – rezedalepke

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – hajnalpírllepke

Lycenidae – Boglárkalepke-félék

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) – zöldfonákú boglárka

Satyrion spini ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kökény farkosboglárka

Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) – tölgyfaboglárka

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) – ezüstös boglárka

P. argyrognomon (Bergstrasser, 1779) – csillogó boglárka

Polyommatus daphnis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csipkés boglárka

P. icarus (Rottemburg, 1775) – közönséges boglárka

Nymphalidae – Tarkalepkefélék

Libythea celtis (Laicharting in Fuessly, 1782) – csőröslepke

Melitaea trivia ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kis tarkalepke

M. athalia (Rottemburg, 1775) – ligeti tarkalepke

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – pókhálóslepke

Nymphalis io (Linnaeus, 1758) – nappali pávaszem

N. urticae (Linnaeus, 1758) – kis róka

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – c-betűs lepke

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – atalantalepke

V. cardui (Linnaeus, 1758) – bogáncsllepke

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – nagy gyöngyházlepke

Boloria dia (Linnaeus, 1758) – kis gyöngyházlepke

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – közönséges gyöngyházlepke

Arethusa arethusa ([Denis et Schiffermüller], 1775) – közönséges szemeslepke

Brintesia circe (Linnaeus, 1758) – fehérőves szemeslepke

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) – barna szemeslepke

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – kis szénalepke

Lasionmata megera (Linnaeus, 1758) – vörös szemeslepke

Pararge egeria (Linnaeus, 1758) – erdei szemeslepke

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) – nagy ökörszemlepke

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) – közönséges sakkáblalepke

Drepanidae – Sarlósszövk

Cilix glaucatus (Scopoli, 1763) – szürkefoltos törpészövk

Drepana falcatoria (Linnaeus, 1758) – nyárfa-sarlósszövk

Sabra harpagula (Esper, 1786) – hársfa sarlósszövk

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) – tölgyfa sarlósszövk

Thyatiridae – Pihésszövk

Polyplaca ridens (Fabricius, 1787) – zöldes pihésszövk

Asphalia ruficollis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörösnakú pihésszövk

Cymatophorima diluta ([Denis et Schiffermüller], 1775) – őszi pihésszövk

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1767) – fehérsávós pihésszövk

Tethea ocularis (Linnaeus, 1758) – pápaszemes pihésszövk

T. or ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bélyeges pihésszövk

Thyatira batis (Linnaeus, 1758) – rózsafoltos pihésszövk

Geometridae – Araszolólepkék

Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tavaszi juhararaszoló

A. aceraria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – négy-pettyes téliaraszoló

Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) – bíborsávós pirosaraszoló

Cataclysmia rigata (Hübner, 1813) – hullámvonalas szürkearaszoló

Phibalapterix virgata (Hufnagel, 1767) – sárgás galajaraszoló

Scotopteryx coarctaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vonalkás araszoló

S. mucronata (Scopoli, 1763) – agyagszürke araszoló

S. chenopodiata (Linnaeus, 1758) – libatop-araszoló

S. bipunctaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – lóhere-araszoló

Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794) – sokszávu araszoló

Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) – csuklyás tarkaaraszoló

C. rubidata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – piros tarkaaraszoló

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) – kétvonalas sávósaraszoló

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) – vándoraraszoló

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) – közönséges tarkaaraszoló

X. spadicearia ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sávós tarkaaraszoló

Euphyia frustata (Treitschke, 1828) – sokvonalas zöldaraszoló

E. biangulata (Haworth, 1809) – szegletes tarkaaraszoló

Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) – gyászos tarkaaraszoló

E. galiata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sávós galajaraszoló

E. rivata (Hübner, 1813) – ékfoltos tarkaaraszoló

- Epirrhoe alternata* (Müller, 1764) – galaj-tarka-araszoló
- Earophila badiata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csipkerózsa-araszoló
- Anticlea derivata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vadrózsa-tarka-araszoló
- Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758) – nagy tarka-araszoló
- Colostygia pectinataria* (Knoch, 1781) – zöld levél-araszoló
- Chloroclysta siterata* (Hufnagel, 1767) – változékony zöldaraszoló
- Cidaria fulvata* (Forster, 1771) – sárga rózsaa-araszoló
- Pennithera firmata* (Hübner, 1822) – rozsdabarna er-deifenyő-araszoló
- Thera variata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – változékony fenyőaraszoló
- Thera juniperata* (Linnaeus, 1758) – ősz boróka-araszoló
- Eulithis prunata* (Linnaeus, 1758) – kökény-tarka-araszoló
- E. mellinata* (Fabricius, 1787) – sárga ribiszke-araszoló
- E. pyraliata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sárga galajaraszoló
- Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758) – szemes galajaraszoló
- Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758) – kis téliaraszoló
- O. fagata* (Scharfenberg, 1805) – fakó téliaraszoló
- Epirrita dilutata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szürke ősziaraszoló
- Minoa murinata* (Scopoli, 1763) – kutya-tej-araszoló
- Asthena albulata* (Hufnagel, 1767) – gyertyán-fehérraszoló
- Philereme vetulata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – levélsodró-araszoló
- P. transversata* (Hufnagel, 1767) – varjútővis-araszoló
- Hydria cervinalis* (Scopoli, 1763) – őzbarna araszoló
- Triphosa dubitata* (Linnaeus, 1758) – kutyabenge-araszoló
- Pareulype berberata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sóska-fa-tarka-araszoló
- Horisme vitalbata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tarka iszalag-araszoló
- H. corticata* (Treitschke, 1835) – barna iszalag-araszoló
- H. tersata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fakó iszalag-araszoló
- Melanthia procellata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hullámos tarka-araszoló
- Perizoma alchemillata* (Linnaeus, 1758) – árvacsalán-apróaraszoló
- P. lugdunaria* (Herrich-Schäffer, 1845) – ligeti apró-araszoló
- P. hydrata* (Treitschke, 1829) – tompaszárnyú szegfű-araszoló
- P. bifaciata* (Haworth, 1809) – szürkésávó apróaraszoló
- Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, 1809) – vörösszürke törpearaszoló
- Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809) – zöldestörpearaszoló
- Pasiphila rectangulata* (Linnaeus, 1758) – almavirág-törpearaszoló
- Eupithecia haworthiata* Doubleday, 1856 – iszalag-törpearaszoló
- E. linariata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vonalas törpearaszoló
- E. abbreviata* Stephens, 1831 – tölgylakó törpearaszoló
- E. dodoneata* Guenée, 1858 – tölgyes-törpearaszoló
- E. ericeata* (Rambur, 1833) – hanga-törpearaszoló
- E. lariciata* (Freyer, 1842) – vörösfenyő-törpearaszoló
- E. pimpinellata* (Hübner, 1813) – palástfü-törpearaszoló
- E. immotata* (Hufnagel, 1767) – hegyesszárnyú törpearaszoló
- E. graphata* (Treitschke, 1828) – hangyabogáncs törpearaszoló
- E. centaureata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – búzavirág-törpearaszoló
- E. insigniata* (Hübner, 1790) – galagonya-törpearaszoló
- E. gueneata* Milliére, 1862) – téglavörös törpearaszoló
- E. absinthiata* (Clerck, 1759) – üröm-törpearaszoló
- E. assimilata* Doubleday, 1856 – komló-törpearaszoló
- E. icterata* (de Villers, 1789) – rácsos törpearaszoló
- E. impurata* (Hübner, 1813) – fakószürke törpearaszoló
- Aplocera praeformata* (Hübner, 1826) – hegyi csíkos-araszoló
- A. plagiata* (Linnaeus, 1758) – szürke csíkosaraszoló
- Lithostege griseata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szürke araszoló
- L. farinata* (Hufnagel, 1767) – ezüstfehér araszoló
- Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767) – szárnyfüggelékes araszoló
- Trichopteryx polycommata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörhenyes szürkearaszoló
- T. carpinata* (Borkhausen, 1794) – tavaszi szürke-araszoló
- Idaea rufaria* (Hübner, 1799) – vörhenyes sávosa-araszoló
- I. sericeata* (Hübner, 1813) – selymes sávosa-araszoló
- I. ochrata* (Scopoli, 1763) – sárgásbarna sávosa-araszoló
- I. serpentata* (Hufnagel, 1767) – barnacsíkos sávosa-araszoló
- I. muricata* (Hufnagel, 1767) – mocsári pirosaraszoló

- Idea rusticata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tarka apróaraszoló
- I. filicata* (Hübner, 1799) – felemásszárnnyú apróaraszoló
- I. moniliata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rácsos sávósaraszoló
- I. biselata* (Hufnagel, 1767) – mocsári sávósaraszoló
- I. humiliata* (Hufnagel, 1767) – sárgaszélű apróaraszoló
- I. poliata* (Hübner, 1793) – vonalas apróaraszoló
- I. dimidiata* (Hufnagel, 1767) – gyakori apróaraszoló
- I. subsericeata* (Haworth, 1809) – selymes sávósaraszoló
- I. pallidata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sárgacsíkos sávósaraszoló
- I. aversata* (Linnaeus, 1758) – nagy sávósaraszoló
- I. degeneraria* (Hübner, 1799) – barnás sávósaraszoló
- I. deversaria* (Herrich-Schäffer, 1847) – egyszínű sávósaraszoló
- Scopula immorata* (Linnaeus, 1758) – réti sávósaraszoló
- S. corrivalaria* (Kretschmar, 1862) – lápi apróaraszoló
- S. nigropunctata* (Hufnagel, 1767) – feketepettyes arzszoló
- S. virgulata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vészszős sávósaraszoló
- S. ornata* (Scopoli, 1763) – díszes fehéraraszoló
- S. decorata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kakukkfű-araszoló
- S. rubiginata* (Hufnagel, 1767) – réti pirosaraszoló
- S. marginipunctata* (Goeze, 1781) – pettyes sávósaraszoló
- S. floslactata* (Haworth, 1809) – fényes sávósaraszoló
- Rhodostrophia vibicaria* (Clerck, 1759) – pirosszélű arzszoló
- Cyclophora annulata* (Schulze, 1775) – gyűrűs pettyesaraszoló
- C. porata* (Linnaeus, 1767) – körös pettyesaraszoló
- C. punctaria* (Linnaeus, 1758) – sávós pettyesaraszoló
- Timandra griseata* (Petersen, 1902) – pirosscsíkos csipkésaraszoló
- Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1758) – vörössávós vándoraraszoló
- Pseudoterpna pruinata* (Hufnagel, 1767) – hamvas zöldaraszoló
- Comibaena bajularia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – foltos zöldaraszoló
- Thetidia smaragdaria* (Fabricius, 1787) – füzöld-araszoló
- Hemistola chrysoprasaria* (Esper, 1795) – kékes zöld-araszoló
- Jodis lactearia* (Linnaeus, 1758) – zöldes fehéraraszoló
- Thalera fimbrialis* (Scopoli, 1763) – csipkészlű zöldaraszoló
- Chlorissa cloraria* (Hübner, 1813) – barnaszegélyű zöldaraszoló
- Phaioграмма etruscaria* (Zeller, 1849) – fehérpettyes zöldaraszoló
- Abraxas grossulariata* (Linnaeus, 1758) – köszméte-araszoló
- Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758) – szegélyes nyárfaaraszoló
- Ligdia adustata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – barna levélaraszoló
- Stegania cararia* (Hübner, 1790) – hármassfoltú nyírfaaraszoló
- S. dilectaria* (Hübner, 1799) – sárga nyárfaaraszoló
- Cabera exanthemata* (Scopoli, 1763) – pettyes füzfa-araszoló
- C. pusaria* (Linnaeus, 1758) – fehér égeraraszoló
- Theria rupicaprararia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tavaszi kökényaraszoló
- Ennomos autumnaria* (Werneburg, 1859) – őszi levélaraszoló
- Selenia dentaria* (Fabricius, 1775) – kétfoltos holdas-araszoló
- S. lumularia* (Hübner, 1788) – vonalas holdasaraszoló
- S. tetralunaria* (Hufnagel, 1767) – négyfoltos holdas-araszoló
- Artiora evonymaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kecskerágó-araszoló
- Crocallis elinguararia* (Linnaeus, 1758) – sárga sávósaraszoló
- Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758) – citrom-sárga arzszoló
- Ourapterix sambucaria* (Linnaeus, 1758) – fecskefarkú arzszoló
- Plagodis pulveraria* (Linnaeus, 1758) – szemcsés arzszoló
- Therapis flavicaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – foltosszlű arzszoló
- Pseudopanthera macularia* (Linnaeus, 1758) – párdúcfoltos arzszoló
- Colotois pennaria* (Linnaeus, 1761) – tollascsapú tél-araszoló
- Apeira syringaria* (Linnaeus, 1758) – orgona-araszoló
- Hylaea fasciaria* (Linnaeus, 1758) – erdeifenyő-sávósaraszoló
- Campaea margaritata* (Linnaeus, 1767) – gyöngyház-fényű arzszoló
- Semiothisa alternata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – közönséges szürkearaszoló
- S. liturata* (Clerck, 1759) – szürke fenyőaraszoló
- S. clathrata* (Linnaeus, 1758) – rácsos rétiaraszoló
- S. glarearia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bőrszínű arzszoló
- Narraga fasciolaria* (Hufnagel, 1767) – homoki tarka-araszoló

- Itame wauaria* (Linnaeus, 1758) – szürke ribiszke-
araszoló
- Tephria arenacearia* ([Denis et Schiffermüller],
1775) – sárga lucerna-araszoló
- T. murinaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szür-
ke lucerna-araszoló
- Siona lineata* (Scopoli, 1763) – vonalas fehéraraszoló
- Dyscia conspersaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
– sziklaüröm-araszoló
- Synopsia sociaria* (Hübner, 1799) – ürömaraszoló
- Aspitates gilvarius* ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
zanótaraszoló
- Odontognophos dumetatus* (Treitschke, 1827) –
csücskös sziklaaraszoló
- Gnophos furvatus* ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
nagy sziklaaraszoló
- Charissa obscurata* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
– sötét sziklaaraszoló
- Euchrognophos variegata* Duponchel, 1838 – tarka
sziklaaraszoló
- Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758) – barna réti-
araszoló
- Angerona prunaria* (Linnaeus, 1758) – sárga kökény-
araszoló
- Bupalus piniarius* (Linnaeus, 1758) – fenyőaraszoló
- Peribatodes rhomboidarius* ([Denis et Schiffermüller],
1775) – ékköves faaraszoló
- Selidosema brunnearium* (de Villers, 1789) – fésűs
barnaaraszoló
- Hypomecis roboraria* ([Denis et Schiffermüller],
1775) – nagy tölgyfaaraszoló
- H. punctinalis* (Scopoli, 1763) – pettyes faaraszoló
- Cleora cinctaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
körfoltos faaraszoló
- Ascotis selenaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
holdas faaraszoló
- Ectropis crepuscularia* ([Denis et Schiffermüller],
1775) – avararaszoló
- Biston stratarius* (Hufnagel, 1767) – barnasávós tava-
szí-araszoló
- B. betularius* (Linnaeus, 1758) – változékony szürke-
araszoló
- Lycia hirtaria* (Clerck, 1759) – közönséges tavaszi-
araszoló
- L. zonaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – öves ta-
vaszi-araszoló
- Apocheima hispidaria* ([Denis et Schiffermüller],
1775) – borzas tavaszi-araszoló
- Agriopsis leucophaearia* ([Denis et Schiffermüller],
1775) – tölgyfa tavaszi-araszoló
- A. marginaria* (Fabricius, 1776) – sárgás tavaszi-
araszoló
- A. aurantiaria* (Hübner, 1799) – arany-sárga téli-
araszoló
- A. bajaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kökény
téliaraszoló
- Phigalia pilosaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
zöldes tavaszi-araszoló
- Erannis defoliaria* (Clerck, 1759) – nagy téliaraszoló
- Notodontidae** – Púposzszövk
- Cerura erminea* (Esper, 1783) – hermelin púposzszövő
- Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758) – barna levél-
szövő
- C. curtula* (Linnaeus, 1758) – rövidszárnyú levélszövő
- C. pigra* (Linnaeus, 1758) – apró levélszövő
- Dicramura ulmi* ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
szilfa-púposzszövő
- Drymonia dodonea* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
– bélyeges púposzszövő
- Drymonia querna* ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
tölgyfa- púposzszövő
- D. ruficornis* (Hufnagel, 1767) – cserfa-púposzszövő
- Euchila palpina* (Linnaeus, 1758) – csőrös púposzszövő
- Furcula bifida* (Brahm, 1787) – kis púposzszövő
- Gluphisia crenata* (Esper, 1785) – kormos púposzszövő
- Harpyia milhauseri* (Fabricius, 1775) – pergament
púposzszövő
- Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758) – zezgugos púpos-
szövő
- N. tritophus*, ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tara-
jos púposzszövő
- Ochrostigma velitaris* (Hufnagel, 1767) – hegyi pú-
poszszövő
- Peridea anzeps* Goeze, 1781 – füstös púposzszövő
- Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758) – sárgafoltos pú-
poszszövő
- P. bucephaloides* (Ochsenheimer, 1810) – magyar pú-
poszszövő
- Pheosia tremula* (Clerck, 1759) – nyárfa- púposzszövő
- Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758) – tevenyakú pú-
poszszövő
- P. cucullina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csuk-
lyás púposzszövő
- Ptilophora plumigera* ([Denis et Schiffermüller],
1775) – tollascsapú púposzszövő
- Spatalia argentina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
ezüstfoltos púposzszövő
- Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758) – bükkfa-púposzszövő
- Lymantriidae** – Gyapjaslepkék
- Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764) – L-betűs szövő
- Dicallomera fascelina* (Linnaeus, 1758) – vesszős
szövő
- Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758) – bükk-gyap-
jaslepke
- Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758) – aranyfarú
kisszövő
- E. similis* (Fuessly, 1775) – sárgafarú kisszövő
- Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758) – gyapjaslepke

- Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758) – rozsdabarna kis-szövő
- Pentophera morio* (Linnaeus, 1758) – réti gyapjaslepke
- Ctenuchidae** – Álc süngőlepkék
- Dysauxes ancilla* (Linnaeus, 1758) – üvegpettyes álc-süngő
- Amata phegea* (Linnaeus, 1758) – fehérpettyes álc-süngő
- Arctiidae** – Medvelepkefélék
- Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758) – fekete zuzmó-szövő
- Arctia caja* (Linnaeus, 1758) – közönséges medvelepke
- A. villica* (Linnaeus, 1758) – fekete medvelepke
- Chelis maculosa* Gerning, 1780 – foltos medvelepke
- Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758) – vörösszélű medvelepke
- Diaphora mendica* (Clerck, 1759) – felemás medvelepke
- Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) – csíkos medvelepke
- Hyphantria cunea* Drury, 1773 – amerikai fehér medvelepke
- Ocnogyna parasita* Hübner, 1790 – csonkaszárnú medvelepke
- Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758) – füstös medvelepke
- Rhyparia purpurata* (Linnaeus, 1758) – bíborszínű medvelepke
- Spilosoma lubricipedium* (Linnaeus, 1758) – tejszínű medvelepke
- S. luteum* (Hufnagel, 1767) – sárgás medvelepke
- S. urticae* Esper, 1789 – hőszerű medvelepke
- Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758) – jakablepke
- Uretheisa pulchella* (Linnaeus, 1758) – vérpettyes medvelepke
- Watsonarctia deserta* (Bartel, 1902) – tarka medvelepke
- Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758) – csontszínű molyszövő
- Eilema complana* (Linnaeus, 1758) – közönséges zuzmószövő
- E. griseola* (Hübner, 1803) – szürke zuzmószövő
- E. lurideola* (Zincken, 1817) – fakó zuzmószövő
- E. palliatella* (Scopoli, 1763) – egyszínű zuzmószövő
- E. lutarella* (Linnaeus, 1758) – narancsszínű zuzmószövő
- E. pseudocomplana* (Daniel, 1939) – selyemfényű zuzmószövő
- E. sororcula* (Hufnagel, 1767) – sárga zuzmószövő
- Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758) – négypettyes zuzmószövő
- Mitochondria miniata* (Forster, 1771) – piros medvelepke
- Pelosiopsis muscerda* (Hufnagel, 1767) – hamvas algaszövő
- P. obtusa* (Herrich-Schäffer, 1847) – lápi algaszövő
- Setina roscida* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sárga algaszövő
- Thumata senex* (Hübner, 1803) – mocsári medvelepke
- Nolidae** – Pamacsos-szövők
- Meganola albula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fehér pamacsos-szövő
- Nola aerugula* Hübner, 1793 – barnacsíkos pamacsos-szövő
- N. cicatricalis* (Treitschke, 1835) – szürke pamacsos-szövő
- N. cristatula* (Hübner, 1793) – törpe pamacsos-szövő
- N. cuculatella* (Linnaeus, 1758) – barna pamacsos-szövő
- Noctuidae** – Bagolylepkék
- Herminia grisealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ligeti karcsúbagoly
- Idia calvaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – mozaikbagoly
- Macrochilo cribrumalis* (Hübner, 1793) – csontszínű karcsúbagoly
- Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794) – sárgás karcsúbagoly
- Polypogon strigilata* (Linnaeus, 1758) – hosszúcsápú karcsúbagoly
- P. tentacularia* (Linnaeus, 1758) – sötétaljú karcsúbagoly
- Phytometra viridaria* (Clerck, 1759) – pirossávós apróbagoly
- Rivula sericealis* (Scopoli, 1763) – sárga apróbagoly
- Schrankia costae strigalis* (Stephens, 1834) – keskenyszárnú karcsúbagoly
- Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758) – ormányos karcsúbagoly
- H. rostralis* (Linnaeus, 1758) – közönséges karcsúbagoly
- Aedia funesta* (Esper, 1786) – folyófübagoly
- Callistege mi* (Clerck, 1759) – lóhere-nappalibagoly
- Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790) – öblösszárnú bagoly
- Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758) – kék övesbagoly
- C. fulminea* (Scopoli, 1763) – kökény-sárgaövesbagoly
- C. hymenaea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – galagonya-sárgaövesbagoly
- C. nupta* (Linnaeus, 1767) – piros övesbagoly
- C. nymphagga* (Esper, 1787) – kis sárgaövesbagoly
- C. puerpera* (Giorna, 1791) – nyárfa-övesbagoly
- Dysgonia algira* (Linnaeus, 1758) – ibolyásbarna vándorbagoly
- Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758) – közönséges nappalibagoly

- Gonospileia triquetra* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – háromszöges nappalibagoly
- Laspeyria flexula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csipkés zuzmóbagoly
- Lygephila cracca* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bükkönybagoly
- L. lusoria* (Linnaeus, 1758) – nagy csüdfübagoly
- L. pastinum* (Treitschke, 1826) – kis csüdfübagoly
- L. procax* (Hübner, 1813) – vonalkás koronafürtbagoly
- Minucia lunaris* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagy foltosbagoly
- Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1758) – kéményseprőlepke
- Prodotis stolidus* (Fabricius, 1775) – barnasávós vándorbagoly
- Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758) – vörös csipkésbagoly
- Tyta luctuosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fekete nappalibagoly
- Acontia lucida* (Hufnagel, 1766) – fehér nappalibagoly
- Calymma communimacula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pajzstetűfaló bagoly
- Deltote bankiana* (Fabricius, 1775) – ezüstös apróbagoly
- D. deceptor* (Scopoli, 1763) – tölgyes-apróbagoly
- D. uncula* (Clerck, 1759) – lápi apróbagoly
- Elaphria venustula* (Hübner, 1791) – cifra lápi bagoly
- Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763) – zebra bagoly
- Eublemma ostrina* (Hübner, 1808) – szalmagyopár bíborbagoly
- E. parva* (Hübner, 1808) – apró vándorbagoly
- E. purpurina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – közönséges bíborbagoly
- Metachrostis dardouini* (Boisduval, 1840) – apró lilombagoly
- Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766) – fehérsávós apróbagoly
- Pseudeustrotia candidula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fehéres apróbagoly
- Nycteola asiatica* (Krulikovsky, 1904) – nyárfa-apróbagoly
- N. revayana* (Scopoli, 1772) – változékony apróbagoly
- Earias chlorana* (Linnaeus, 1761) – füzfa-zöldbagoly
- E. vernana* (Fabricius, 1787) – nyárfa-zöldbagoly
- Bena prasinana* (Linnaeus, 1758) – bükkfa zöldbagoly
- Pseudopsis bicolorana* (Fuessly, 1775) – tölgyfa-zöldbagoly
- Eutelia adalatrix* (Hübner, 1813) – cserszömörcebagoly
- Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758) – mogyoróbagoly
- Acronicta alni* (Linnaeus, 1767) – felemásszínű szigonyosbagoly
- A. auricoma* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kökénybagoly
- A. euphorbiae* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kutyatejbagoly
- A. megacephala* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagyfejű bagoly
- A. psi* (Linnaeus, 1758) – szürkés szigonyosbagoly
- A. rumicis* (Linnaeus, 1758) – sóskabagoly
- A. tridens* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – barnás szigonyosbagoly
- Craniophora ligustri* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fagyalbagoly
- Oxicesta geographica* (Fabricius, 1787) – térképbagoly
- Simyra albovenosa* (Goeze, 1781) – halvány lápi bagoly
- S. nervosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pusztai lándzsásbagoly
- Cryphia algae* (Fabricius, 1775) – sárgászöld zuzmóbagoly
- C. domestica* (Hufnagel, 1766) – fehéreszöld zuzmóbagoly
- C. ereptricula* (Treitschke, 1825) – világostövű zuzmóbagoly
- C. fraudatricula* (Hübner, 1803) – szürke zuzmóbagoly
- C. raptricula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – palaszínű zuzmóbagoly
- Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766) – gyujtoványfű-apróbagoly
- C. opalina* (Esper, 1794) – foltos fehér bagoly
- C. platyptera* (Esper, 1788) – oroszlánszájbagoly
- Cucullia artemisiae* (Hufnagel, 1766) – feketeürömcuklyásbagoly
- C. campanulae* Freyer, 1831 – harangvirág-cuklyásbagoly
- C. dracunculi* (Hübner, 1813) – lilásszürke cuklyásbagoly
- C. umbratica* (Linnaeus, 1758) – közönséges cuklyásbagoly
- C. lactucae* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – salátacuklyásbagoly
- C. xeranthemi* Boisduval, 1840 – vasvirág-cuklyásbagoly
- Omphalophana antirrhinii* (Hübner, 1803) – oroszlánszáj-apróbagoly
- Shargacucullia lychnitis* (Rambur, 1833) – szalmasárga cuklyásbagoly
- S. verbasci* (Linnaeus, 1758) – ökörfarkkóró-cuklyásbagoly
- Allophyes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758) – galagonya-bagoly
- Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766) – őszi bundásbagoly

- Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785) – zömök fésűsbagoly
- Lamprosticta culta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hármaskoltú bagoly
- Meganephria bimaculosa* (Linnaeus, 1767) – kétfoltos szilbagoly
- Amphipyra livida* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – zsírfényűbagoly
- A. pyramidea* (Linnaeus, 1758) – fahéjszínű zsírosbagoly
- A. tragopoginis* (Clerck, 1759) – bakszakállbagoly
- Valeria oleagina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tavaszi zöldbagoly
- Aegle kaekeritziana* (Hübner, 1813) – felemásszárnýú bagoly
- Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758) – őszi kékesbagoly
- Acosmetia caliginosa* (Hübner, 1813) – zsoltnabagoly
- Actinotia polyodon* (Clerck, 1759) – soksugarú apróbagoly
- Agrochola circellaris* (Hufnagel, 1766) – világosbarna őszibagoly
- A. helvola* (Linnaeus, 1758) – barna őszibagoly
- A. humilis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – olajbarna őszibagoly
- A. laevis* (Hübner, 1803) – barnásszürke őszibagoly
- A. litura* (Linnaeus, 1758) – tarka őszibagoly
- A. lota* (Clerck, 1759) – kecskefűz-őszibagoly
- A. lychnidis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – búza-virág-őszibagoly
- A. macilenta* (Hübner, 1803) – gyertyán-őszibagoly
- A. nitida* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rozsdabarna őszibagoly
- Ammonoconia caecimacula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szürke őszibagoly
- Anorthoa munda* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tölgyes-fésűsbagoly
- Apamea anceps* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – barnásszürke fűbagoly
- A. illyria* Freyer, 1846 – hegyi dudvabagoly
- A. lithoxylea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sárgás dudvabagoly
- A. monoglypha* (Hufnagel, 1766) – nagy dudvabagoly
- A. pabulatricula* (Brahm, 1791) – homályos dudvabagoly
- A. scolopacina* (Esper, 1788) – okkermintás fűbagoly
- A. sordens* (Hufnagel, 1766) – kalászragó bagoly
- A. sublustris* (Esper, 1788) – rozsdás dudvabagoly
- Aporophila lutulenta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sziki őszibagoly
- Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825) – kis nádibagoly
- A. geminipuncta* (Haworth, 1809) – kétpettyes nádibagoly
- Atethmia centrago* (Haworth, 1809) – bíborsávós díszbagoly
- Arenostola phragmitidis* (Hübner, 1803) – sárga nádi-bagoly
- Atethmia ambusta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – körtebagoly
- Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835) – közönséges selymesbagoly
- A. lepigone* (Möschler, 1860) – fényesszárnýú lápi-bagoly
- A. palustris* (Hübner, 1828) – kormos lápi-bagoly
- Atypha pulmonaris* (Esper, 1790) – tüdőfűbagoly
- Auchmis detera* (Esper, 1787) – sóskaborbolya-bagoly
- Blepharita satura* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – őszi gyombagoly
- Calamia tridens* (Hufnagel, 1766) – zöld fűbagoly
- Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766) – szulákbagoly
- Chilodes maritima* (Tauscher, 1806) – keskeny nádibagoly
- Cloanthia hyperici* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – orbáncfű-apróbagoly
- Chortodes fluxa* (Hübner, 1809) – változékony sásbagoly
- Ch. minima* (Haworth, 1809) – hullámcsíkos apróbagoly
- Ch. extrema* (Hübner, 1809) – csontszínű lápi-bagoly
- Ch. morrissii* (Dale, 1839) – szürkésfehér fűbagoly
- Ch. pygmina* (Haworth, 1809) – vörhenyes sásbagoly
- Cleoceris scoriacea* (Esper, 1789) – szürke lilombagoly
- Conisania luteago* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sárgás szegfűbagoly
- Conistra erythrocephala* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörösfényű őszibagoly
- C. ligula* (Esper, 1791) – hegyesszárnýú őszibagoly
- C. rubiginea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörös őszibagoly
- C. rubiginosa* (Scopoli, 1763) – feketefoltos télibagoly
- C. vaccinii* (Linnaeus, 1758) – változékony őszibagoly
- Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767) – kis lombbagoly
- C. diffinis* (Linnaeus, 1767) – szilfa-lombbagoly
- C. pyralina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tölgyfa lombbagoly
- C. trapezina* (Linnaeus, 1758) – közönséges lombbagoly
- Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766) – háromsávós fűbagoly
- Dichonia aprilina* (Linnaeus, 1758) – őszi zöldbagoly
- D. convergens* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – őszi tölgybagoly
- Dicycla oo* (Linnaeus, 1758) – sárga tölgybagoly
- Dioszeghyana schmidtii* (Diószeghy, 1935) – magyar fésűsbagoly

- Dryobotodes eremita* (Fabricius, 1775) – változékony tölgybagoly
- D. monochroma* (Esper, 1790) – szürke tölgybagoly
- Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758) – szurokbarna bagoly
- Dyschorista ypsillon* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sötétmintás füzbagoly
- Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758) – változó szürkebagoly
- Episema glaucina* (Esper, 1789) – fogasjegyű lilombagoly
- E. tersa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hármasesjegyű lilombagoly
- Eriopygodes imbecilla* (Fabricius, 1794) – pitypangbagoly
- Eucarta virgo* (Treitschke, 1835) – mocsári biborbagoly
- Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758) – szederbagoly
- Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766) – rozsdabarna télibagoly
- Gortyna flavago* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kénsárga nádibagoly
- Hada plebeja* (Linnaeus, 1761) – hamvas kertibagoly
- Hadena bicruris* (Hufnagel, 1766) – szürke szegfűbagoly
- **H. capsincola* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – habszegfű-szürkebagoly
- H. confusa* (Hufnagel, 1766) – fehérfoltos szegfűbagoly
- H. irregularis* (Hufnagel, 1766) – homoki szegfűbagoly
- H. compta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – foltos szegfűbagoly
- Hadula trifolii* (Hufnagel, 1766) – lóherebagoly
- Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766) – világos kertibagoly
- H. dysodea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – parajbagoly
- Heliophobus reticulata* (Goeze, 1781) – fehéreres kertibagoly
- Hoplodrina alsines* (Brahm, 1791) – őzbarna selymesbagoly
- H. ambigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szürkésbarna selymesbagoly
- H. blanda* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sötétbarna selymesbagoly
- H. respersa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pontozott selymesbagoly
- H. superstes* (Ochsenheimer, 1816) – rőtarna selymesbagoly
- Hydraecia micacea* (Esper, 1789) – barna lápbagoly
- Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1758) – nyárfalombbagoly
- I. subtusa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kőrislombbagoly
- Jodia croceago* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – élénksárga őszibagoly
- Lacanobia aliena* (Hübner, 1809) – sötét homokibagoly
- L. blenna* (Hübner, 1824) – vándor kertibagoly
- L. contigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hamvasszürke rétibagoly
- L. oleracea* (Linnaeus, 1758) – salátabagoly
- L. suasa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tarka kertibagoly
- L. thalassina* (Hufnagel, 1766) – borbolyabagoly
- L. w-latium* (Hufnagel, 1766) – rekettyebagoly
- Leucania obsoleta* (Hübner, 1803) – pontozott rétibagoly
- Lithophane ornitopus* (Hufnagel, 1766) – közönséges fabagoly
- Luperina testacea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szürkés fűbagoly
- Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758) – káposztabagoly
- Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761) – fehérfoltos kertibagoly
- Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) – változékony dudvabagoly
- Mesogona acetosellae* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – barna madársóska-bagoly
- Mesoligia furuncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kétszínű dudvabagoly
- M. literosa* (Haworth, 1809) – lilásszárnyú dudvabagoly
- Mythimna albipuncta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fehérpettyes fűbagoly
- M. conigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fehérjegyes fűbagoly
- M. ferrago* (Fabricius, 1767) – rozsdaszínű rétibagoly
- M. impura* (Hübner, 1808) – barna rétibagoly
- M. l-album* (Linnaeus, 1758) – L-betűs fűbagoly
- M. pallens* (Linnaeus, 1758) – sápadt fűbagoly
- M. pudorina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörös rétibagoly
- M. straminea* (Treitschke, 1825) – szalmaszínű rétibagoly
- M. turca* (Linnaeus, 1758) – félholdas bagoly
- M. vitellina* (Hübner, 1808) – sárga rétibagoly
- M. unipuncta* (Haworth, 1809) – vándor rétibagoly
- Naenia typica* (Linnaeus, 1758) – hálózatos sóska-bagoly
- Oligia latruncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – feketés dudvabagoly
- O. strigilis* (Linnaeus, 1758) – apró dudvabagoly
- O. versicolor* (Borkhausen, 1792) – szürkés dudvabagoly
- Orthosia cerasi* (Fabricius, 1779) – közepes fésűsbagoly

- Orthosia cruda* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kis fésűsbagoly
- O. gothica* (Linnaeus, 1758) – foltos fésűsbagoly
- O. gracilis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – karcsú fésűsbagoly
- O. incerta* (Hufnagel, 1766) – változékony fésűsbagoly
- O. miniosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sárgás fésűsbagoly
- O. opima* (Hübner, 1809) – hegyesszárnú fésűsbagoly
- O. populeti* (Fabricius, 1781) – nyárfa-fésűsbagoly
- Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766) – nagy fésűsbagoly
- Panolis flammea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fenyőbagoly
- Paradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763) – négy pettyes selymesbagoly
- Parastichtis suspecta* (Hübner, 1817) – rozsdásszürke nyárfabagoly
- Perigrapha i-cinctum* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tavaszi fésűsbagoly
- Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758) – zöldes csipkésbagoly
- Platyperigea kadenii* (Freyer, 1836) – őszi selymesbagoly
- Polia bombycina* (Hufnagel, 1766) – lilásszürke kertibagoly
- P. nebulosa* (Hufnagel, 1766) – ködfoltos bagoly
- Polymixis polymita* (Linnaeus, 1758) – kankalin-tarkabagoly
- P. xanthomista* (Hübner, 1819) – sárgamintás tarkabagoly
- Polyphaenis sericata* (Esper, 1787) – selyemfényű bagoly
- Rhizedra lutosa* (Hübner, 1803) – óriás nádibagoly
- Rusina ferruginea* (Esper, 1785) – gyászos fésűsbagoly
- Scotochrosta pulla* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sötét őszibagoly
- Sedina buettneri* (Hering, 1858) – lápi lándzsásbagoly
- Senta flammea* (Curtis, 1828) – lándzsás lápi bagoly
- Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775) – vörhenyes szegfűbagoly
- S. albicolon* (Hübner, 1813) – szürke kertibagoly
- S. lampra* (Schawerda, 1913) – földitömjén-sziklabagoly
- Spodoptera exigua* (Hübner, 1808) – keleti vándorbagoly
- Thalophila matura* (Hufnagel, 1766) – fakó sárgabagoly
- Tholera cespitis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sötét fésűsbagoly
- Th. decimalis* (Poda, 1761) – közönséges fésűsbagoly
- Tiliacea aurago* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – aransyárga őszibagoly
- T. citrigo* (Linnaeus, 1758) – citromsárga őszibagoly
- T. sulphurago* (Clerck, 1759) – kénsárga őszibagoly
- Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758) – nyári zöldbagoly
- Xanthia togata* (Esper, 1788) – lilamintás őszibagoly
- Xylota exsoleta* (Linnaeus, 1758) – óriás fabagoly
- X. vetusta* (Hübner, 1813) – vörhenyes fabagoly
- Heliothis armigera* (Hübner, 1803) – gyapottokbagoly
- **H.s. maritima* Graslin, 1855 – somkóróbagoly
- H. peltigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – mentabagoly
- H. virescens* (Hufnagel, 1766) – mácsonyabagoly
- Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758) – szarkalábbabagoly
- Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766) – iglicebagoly
- Abrostola agnorista* Dufay, 1956 – ritka csalánbagoly
- A. asclepiadis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vadpárikabagoly
- A. tripartita* (Hufnagel, 1766) – közönséges csalánbagoly
- A. triplasia* (Linnaeus, 1758) – rózsástövű csalánbagoly
- Autographa bractea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – foltos aranybagoly
- A. gamma* (Linnaeus, 1758) – gammabagoly
- Diachrysa chrysis* (Linnaeus, 1758) – zöldfényű aranybagoly
- **D. stenochrysis* (Warren, 1913) – sárgafényű aranybagoly
- Euchalcia consona* (Fabricius, 1787) – rózsaszínes aranybagoly
- Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850) – cseppfoltú ezüstbagoly
- Plusia festucae* (Linnaeus, 1758) – kockás ezüstbagoly
- Agrotis cinerea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szürke földibagoly
- A. clavis* (Hufnagel, 1766) – zömök földibagoly
- A. crassa* (Hübner, 1803) – fésűs földibagoly
- A. exclamatoris* (Linnaeus, 1758) – felkiáltójeles bagoly
- A. ipsilon* (Hufnagel, 1766) – nagy fűbagoly
- A. segetum* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vetési bagoly
- Axylia putris* (Linnaeus, 1758) – vonalkás apróbagoly
- Cerastis rubricosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörhenyes tavaszibagoly
- Chersotis fimbriola* (Esper, 1803) – csillagó földibagoly
- C. margaritacea* (de Villers, 1789) – gyöngyös földibagoly
- C. multangula* (Hübner, 1803) – sokszögű földibagoly

- Chersotis rectangula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – balkáni földibagoly
- Dichagyris forcipula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szürkésbarna földibagoly
- D. nigrescens* (Höfner, 1888) – feketés földibagoly
- Epilecta linogrisea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – karcsú sárgafübagoly
- Euxoa eruta* (Hübner, 1827) – közönséges földibagoly
- E. obelisca* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csíkos fübagoly
- Metagnorisma depuncta* (Linnaeus, 1761) – barna földibagoly
- Noctua comes* (Hübner, 1813) – kis sárgafübagoly
- N. fimbriata* (Schreber, 1759) – szélessávú sárgafübagoly
- N. interposita* (Hübner, 1790) – köztes sárgafübagoly
- N. janthe* (Borkhausen, 1792) – lappangó sárgafübagoly
- N. janthina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tarka sárgafübagoly
- N. orbona* (Hufnagel, 1766) – foltos sárgafübagoly
- N. pronuba* (Linnaeus, 1758) – nagy sárgafübagoly
- Ochropleura plecta* (Linnaeus 1761) – fehérszegélyű fübagoly
- Peridroma saucia* (Hübner, 1808) – nagy földibagoly
- Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766) – hamvas földibagoly
- Xestia baja* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – változékony fübagoly
- X. c-nigrum* (Linnaeus, 1758) – c-betűs fübagoly
- X. rhomboidea* (Esper, 1790) – rombuszos földibagoly
- X. sexstrigata* (Haworth, 1809) – szürkésvörös földibagoly
- X. triangulum* (Hufnagel, 1766) – hároszöges földibagoly
- X. xanthographa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tarka fübagoly