

**ADATOK A BALATON-FELVIDÉK NAGYLEPKE  
(MACROLEPIDOPTERA) FAUNÁJÁHOZ, II. VÁSZOLY ÉS  
KÖRNYÉKE**

**KÁLLÓ IMRE—SIMONYI SÁNDOR—SZÉCSÉNYI LAJOS**

**Budapest**

**ABSTRACT:** Data to the Macrolepidoptera fauna of Balaton Highland II. In this paper authors describe their results of faunistical investigations carried out on Lepidoptera species, in the neighbourhood of Vászoly and Dörgicse during 10 years. A comprehensive of the Lepidoptera communities occurring on the characteristic biotops of the area is given by introducing the 670 species collected, emphasising the rare species. Results of their investigations supports the diversified nature of the fauna of the relatively small area.

**Bevezetés**

Jelen dolgozatban az 1976-tól 1985-ig terjedő időszakban Vászoly és környékén /Vászoly, Dörgicse, Barnag/ végzett nagylepke fauna kutatásaink eredményeit kívánjuk összefoglalóan bemutatni. Munkánkat a Bakonyi Természettudományi Múzeum irányítása alatt és segítségével "A Bakony természeti képe" program keretében folytattuk, amiért ezúton mondunk köszönetet.

**Gyűjtési szempontok és módszerek**

Fontosnak tartottuk, hogy a gyűjtések összességében a teljes vegetációs időszakot átfedjék. Időnköz és lehetőségeinkhez képest a lehető legtöbb élőhely-típust megpróbáltuk átkutatni. Ehhez jó módszernek bizonyult a kollektíven, azonos időben, de egyszerre több területen alkalmazott párhuzamos gyűjtés. Mindegyik újabb élőhelyek beiktatása mellett a már ismertekre is rendszeresen visszatértünk. Hagyományos technikákat alkalmazva nappal hálóval egyelő gyűjtéseket, emellett rendszeres tápnövény megfigyeléseket, hernyó gyűjtéseket végeztünk. Éjszaka fényforrásként Maxim-lámpát, UV-és kevertfényű églőt használtunk. Esetenként a lámpázás időtartama többnyire az egész éjszakai ciklust átfedte, ezzel egyidőben - főként tavasszal és ősszel - csalátkezelést is folytattunk.

**Faunisztikai megfigyelések**

Vászoly és környékének vegetációs képe - a Balaton-felvidék nagyrészéhez hasonlóan - jellegzetes és ugyanakkor sokszínű képet mutat. A területet a természetes és a kulturnövényzet váltakozása, egymáshoz viszonyított mozaik-szerű elhelyezkedése jellemzi. A továbbiakban célszerűnek látszik kisebb területegységek, jól körülhatárolható gyűjtőhelyek ill. jellegzetes élőhelyek faunisztikai

kai megfigyeléseit ismertetni.

### 1. Vászoly, Öreg-hegy

A D-i, DK-i kitettségű oldalakon a lejtősztep társulások dominálnak. Jelentősebb fauna-komponensek: *Eilema pseudocomplana*, *Ocnogyna parasita*, *Ogygia signifera*, *Cucullia xeranthemi*, *Simyra nervosa*, *Periphanes delphinii*, *Larentia clavaria*, *Scopula flaccidaria*, *Lemonia taraxaci*, *Haemorrhagia titus*, *Cartocephalus palaemon*, *Thymelicus acteon*, *Plebicula amandus*.

Mészki kopárok, sziklagyepek a hegy magasabb részein és a felhagyott kőbányák területén vannak. Ez biztosít élőhelyet pl. az *Euxoa distinguenda*, *Chersotis rectangularis*, *Aporophyla lutulenta*, *Sideridis evidens*, *Cryphia fraudatricula*, *Actinotia radiosa*, *Hoplodrina superstes*, *Gnophos furvata*, *Eupithecia gueneata* fajoknak.

A hegyoldal nagy részén, de csak kisebb csoportokban molyhostölgyet, virágoskőrist találunk főként csereszömörce és galagonya társaságában. A pubescens-tális és bokorerdő komponensek közül érdemes megemlíteni a *Roeselia kolbi*, *Phalera bucephaloides*, *Episema scoriacea*, *Rileyna ana*, *Xantholeuca croceago*, *Eutelia adalatrix* fajokat. Az irodalom szerint fenyér-komponensként nyilvántartott *Xestia cataractae* fajnak viszonylag erős populációja él az Öreg-hegyen és Dörgicsén. Molyhostölgyes bokorerdőkben gyűjtöttük rendszeresen, sőt Balatonarácson: Tamás-hegyen is hasonló élőhelyről került elő. Tekintettel arra, hogy az említett élőhelyek közelében nincs fenyér-biotóp, így tapasztalataink szerint jelenlegi élőhelyi besorolása legalább is megkérdőjelezhető.

A maradvány tölgyesek szegélytársulásában, árnyékosabb tisztásokon tenyésző *Dictamnus albus* a tápnövénye a hazánkban ritka előfordulású *Pyrrhia purpurites*-nek. A néhány bokorra tehető *Colutea arborescens* állományt a kulturhatásnak is "köszönhetően" a kipuuszulás fenyegeti. A rajta élő *Jolana jolana* 1978-ban fogtuk utoljára.

Az Öreg-hegy D-i oldaláról néhány ritka vándorlepke is előkerült: *Mythimna unipuncta*, *Heliothis peltigera*, *Hyles lineata livornica*.

A 300 m fölé emelkedő hegytető és gerinc jellemző fája a csertölgy, elegyesen gyertyán, fenyő, kőris, akác társaságában gazdag aljnövényzettel. A magasabb kitettségű mészki "fennsík" sziklagyepet, az É-ra néző tisztásokon réttársulásokat találunk. Az itteni fauna összetett képet mutat, megfigyelhető azonban a melegibényű quercetális elemek magas aránya pl.: *Hoplitis milhauseri*, *Lamprosticta culta*, *Amphipyra tetra*, *Polyphaenis sericata*, *Epizeuxis calvaria*, az erdőlakók közül: *Conistra ligula*, *Conistra veronicae*, és néhány pinetális komponens: *Panolis flammea*, *Laspeyria flexula*, *Chloroclysta truncata*, *Dendrolimus pini* említhető.

Az É-i, ÉNY-i oldal tölgyvel elegyes gyertyános-bükkös meredeken éri el a hegylábánál kanyargó Vászoly-patakot, melynek hűvös mikroklímájú, É-i irányban néző szegélye bükkösben folytatódik. Innen kerültek elő - a még mindig nagy számban előforduló quercetális komponensek mellett - a nemorális *Cerastis leucograpta*, *Lobophora halterata*, *Ectropis consonaria* a montán jellegű hirofil *Eriopygodes imbecilla* és néhány nyír-éger komponens: *Lobophora sexualata*, *Palimpsestis duplaris*, *Platypteryx curvatula*.

### 2. Vászoly: Hűvös-völgy

Vászoly község D-i határától az Öreg-hegy É-i pereméig húzódó kb. 1 km hosszúságú terület, melyet az állandó vízfolyású Vászoly-patak oszt ketté. Partján fűzes-nyáras láprétet, gyékényes magaskórós társulásokat, nedves kaszálót találunk. A nedvességkedvelő ill. hűvös élőhelyhez kötődő fajok zöme innen került elő. A láperdei-lápréti komponensek közül: *Celama cristatula*, *Mamestra splendens*, *Hyssia cavernosa* gozmenyi, *Celaena leucostigma*, *Trichopteryx virescens*, *Eupithecia veratraria*, *Eupithecia trisignaria*, az arundifil biotópokból: *Photodes extrema*, *Archanaera neurica*, mezofil réti komponensek: *Photodes morrisii*, *Everes alcatas*, a higrofil Senta flammea, az altoherbosa társulásokból: *Xestia ditrapezium*, *Cucullia lactucae*, *Polia bombycina* és a nyár-fűz komponensek közül: *Arctornis l-nigrum*, *Catocala electa*, *Smerinthus ocellata*, *Apatura ilia*.

A Hűvös-völgyben gyűjtöttük - nálunk a Dunántul láprétjein található - a boreális típusú *Paleochrysopehanus hippothoe sumadensis* néhány példányát.

Vászoly környékén a természetes- és kulturvegetációk mellett sokfelé találunk felhagyott kerteket, ruderáliákat. Innen a gyümölcsfaféléken élők közül a *Calymna communimecula*, *Eulithis mellinata* érdemel említést, míg a gyomtársulásokból a nálunk kevésbé ismert és ritka *Eupithecia insigniata*, az üröm-fogyasztók közül a *Cucullia absinthii* és *Cucullia artemisiae*. A közelebbi és távolabbi területek kiterjedt borókássainak jellemző fajai a *Thera juniperata* és az *Eupithecia sobrinata*.

### 3. Dörgicse: Pántlikás-dűlő

Dörgicse községtől a Balaton-part irányába ereszkedő lejtőt több, a parttal párhuzamos törésvonal osztja meg. A felső platószerű területen dolomit törmelekes, sziklás talajon sejtás melegkedvelő gyepeket találunk. Az itteni biotópot néhány ritka vagy lokális előfordulású faj kellően reprezentálja: *Euxoa hastifera*, *Cryphia domestica*, *Eublemma arcuina*. A faszintet elsősorban a ligetszerűen tenyésző molyhostölgyek, virágoskőrisek, a cserjeszintet az olykor sűrű bokrokat képező galagonya ill. boróka alkotják. Döntően quercetális: *Epilecta linogrisea*, *Polyphaenis sericeta*, *Egira pulla*, és pubescentális, bokorerdő komponensek jellemzik a faunát: *Phalera bucephaloides*, *Ocneria rubea*, *Xantholeuca croceago*, *Rileyana fovea*, *Dichonia aeruginea*, *Ennomos quercaria*. Továbbá a galagonya fogyasztó *Eriogaster catax* és a borókán élő *Eupithecia intricata* érdemel említést.

Nyilván a törésvonalak mélyebb fekvésű zártabb vegyes erdeiből került elő a *Meganephria bimaculosa* és a *Lithophane socia*.

Egész faunakutatásunk talán legkiemelkedőbb eredménye a *Brachionycha syriaca* decipulae itteni előkerülése, mely egyben az állat aréjának eddig ismert legnyugatibb előfordulása. Az 1966-tól csak him példányok alapján ismert, hazánk területéről leirt lepkét eddig kevés helyen és kis példányszámban gyűjtötték. Dörgicseán az első him példányt 1981. október 31-én /leg.Simonyi/ majd 1983.november 4-én további hímek mellett két nőtény példányt fogtunk /leg. Kálló és Szécsényi/. A tudomány számára eddig ismeretlen *decipulae* nőtény leírását tartalmazó cikk megjelent /Szécsényi, 1985/.

### 4. Barnag: Som-bokor

A Pécselyi-medence É-i peremét határoló letörés felső szintjén a mészkő kopárakat molyhostölgyes-cserszömörccés karsztbokorerdők, sziklagyepek borítják. A közvetlen közelükben elterülő, Barnag D-i határát megközelítő fennsíkot melegkedvelő gyepek, galagonyások alkotják. Ezt a területet csak 1982 óta kutatjuk, de természetes vegetációjának viszonylagos háborítatlansága és az eddig rögzített fauna-kép mind azt sugallják, hogy további feltárásokat érdemes végezni, mintegy a Vászoly környéki kutatásokat térben kiszélesíteni. Mint-hogy az innen gyűjtött fajok nagy része már Vászolyból és Dörgicseről ismert, ezért pusztán jellemzés képpen csak néhány faunakomponenst említünk. A lejtősztyepp elemek közül: *Eucharhia casta*, *Cucullia gozmanyi*, *Simyra nervosa*, *Lemonia dumi*, *Colias chrysothema*, a quercetális elemek közül: *Dichonia aprilina*, *Eupithecia dodoneata* és a pubescentális elemekből: *Eutelia adalatrix*, *Dichonia aeruginea*.

A Vászoly Öreg-hegyi, a dörgicsei és a barnagi gyűjtőhelyek mészkő ill. dolomit alepközvetű, mediterrán klímehatású területei a hasonló élőhelyi adottságok miatt megközelítően egységes fauna-képet mutatnak. Egymáshoz való viszonyításuk kapcsán csupán néhány fajról mondható el, hogy csak az említett élőhelyek egyikéről került elő /pl.Vászoly, Öreg-hegy: *Amphipyra tetra*, Dörgicse: *Euxoa hastifera*, Barnag, Som-bokor: *Colias chrysothema*/. A Vászoly Hűvös-völgyi adatok az előzőekkel szemben jellegzetesen hűvös-nedves élőhelyi adottságokra, részben montán hatásra utalnak, többnyire nedves réti, lápréti ill. altoherbosa és nemorális komponensek a jellemzőek.

Természetesen - kis területekről lévén szó - az egyes részfaunák nem különíthetők el mereven egymástól, hiszen a klimatikus hatások, bizonyos fajok vagilitása és távolabbi faunák beszűrődése ezt nem teszi lehetővé. Mindazonáltal az egyes jól kikutatott gyűjtőhelyek fajainak jellemző elterjedési alaptípus szerinti %-os felosztása - épp a fauna jelleg jobb megismerése szempontjából - indokoltnak tűnik.

	S	E	P	H	K	M	T	B	V
Vászoly Öreg-hegy	12	43	7	27	0,3	0,1	-	-	10,6
Vászoly Hűvös-völgy	20	47	4	17	-	-	-	0,5	11,5
Dörgicse Pántlikás-dűlő	12	35	7	34	0,6	0,5	0,5	-	10,4
Barnag Som-bokor	14	45	3	30	-	-	-	-	8

S - szibíriai	E - euroszipíriai	P - pontomediterrán
H - holomediterrán	K - pontokaspi	M - mandzsúriai
T - túránóeremieli	B - boreális	V - vándor, egyéb

Megfigyelhető a Vászoly Hűvös-völgyi adatoknál a ponto- és holomediterrán típusú fajok alacsony részesevése, melyet a szibíriai típusok magasabb aránya ellensúlyoz. Ennek épp az ellenkezőjét tapasztaljuk az Öreg-hegyi, dörgicsei és barnagi adatokkal kapcsolatban. Jellemző még a pontokaspi és mandzsúriai elemek Vászoly Öreg-hegyi és dörgicsei jelenléte.

Az alábbi fajlista a Vászoly és környékén 1976-tól 1985-ig gyűjtött nagylepke anyagot tartalmazza, összesen 670 fajt. Balatonakali, Balatonudvari és Kisdörgicse területéről is szerepelnek kiegészítő adatok, ahol csak alkalmi gyűjtéseket végeztünk.

Lelőhelyi rövidítések /zárójelben a nemzetközi irodalomban használatos UTM-gríd hálózat jeleivel/:

V: Vászoly: Öreg-hegy /YN 10/  
 H: Vászoly: Hűvös-völgy /YN 10/  
 D: Dörgicse: Pántlikás-dűlő /YM 09/  
 B: Barnag: Som-bokor /YN 00/  
 A: Balatonakali /YM 09/  
 U: Balatonudvari /YM 19/  
 K: Kisdörgicse /YN 00/

#### A fajok jegyzéke

##### Nolidae

<i>Nola cuculatella</i> L.	V
<i>Roeselia strigula</i> DEN et SCHIFF.	V, H, D
<i>kolbi</i> DANIEL	V, H, D
<i>togatulalis</i> HBN.	V
<i>albula</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Celama cicatricalis</i> HBN.	V
<i>centonalis</i> HBN.	V, D
<i>crisatula</i> HBN.	H

##### Arctiidae

<i>Mitochrista miniata</i> FORST.	V
<i>Cybosia mesomella</i> L.	V, H
<i>Endrosea roscida</i> DEN. et SCHIFF.	V
<i>Lithosia quadra</i> L.	V, H
<i>Eilema griseola</i> HBN.	H
<i>lurideola</i> ZINCK.	H
<i>complana</i> L.	V
<i>lutarella</i> L.	V, H, D
<i>pigmeola pallifrons</i> Z.	V, D
<i>sororcula</i> HUFN.	V, H, B
<i>pseudocomplana</i> DANIEL	V, D
<i>Ocnogyna parasita</i> HBN.	V, D
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> L.	V, H, D, B
<i>Eucharis casta</i> ESP.	V, B
<i>Spilærctia lutea</i> HUFN.	V, H
<i>Spilosoma menthastris</i> ESP.	H, D
<i>Diaphora mendica</i> CL.	V
<i>Rhyparia purpurata</i> L.	V
<i>Diacrisia sannio</i> L.	V, H, B
<i>Arctia caja</i> L.	V, H
<i>villica</i> L.	H
<i>Callimorpha quadripunctaria</i> PODA	V, D

Notodontidae

Cerura furcula CL.	V, H
bifida HBN.	H
Stauropus fagi L.	V, D
Hoplitis milhauseri F.	V, H, D
Exaereta ulmi DEN et SCHIFF	V, H, B
Gluphisia crenata ESP.	V, H
Drymonia querna F.	V, H, D
chaonia ESP.	V, D, B
dodonea HBN.	V
Pheosia tremula CL.	V
Notodonta dromedarius L.	V
phoebe SIEB.	H
ziczac L.	H
Peridea anceps GOEZE	V, H, D, B
Drynobia melagone RKH.	V, H
Lophopteryx cuculla ESP.	V, H
Spatalia argentina DEN. et SCHIFF.	V, D, B
Pterostoma palpina L.	V, H
Ptilophora plumigera ESP.	V, D
Phalera bucephala L.	V, D
bucephaloides O.	V, D
Pygaera pigra L.	V

Lymantriidae

Dasychira pudibunda L.	V, B
fascelina L.	V
Hypogyma morio L.	V, H
Arctornis l-nigrum MÜLL.	V, H
Lymantria disper L.	V, H
Porthesia similis FUESSLY	V
Euproctis chrysorrhoea L.	V
Ocneria rubea F.	V, D

Thaumetopoeidae

Thaumetopoes processionea L.	V, D
------------------------------	------

Noctuidae

Euxoa hastifera DONZ.	D
obelisca DEN. et SCHIFF	V
tritici eruta HBN.	V
nigricans L.	V, D
temera HBN.	V, D
distinguenda LED.	V
aquilina DEN. et SCHIFF.	V, H
Agrotis cinerea DEN. et SCHIFF.	V, D, B
vestigialis HUFN.	D
segetum DEN. et SCHIFF.	V, H, D, B
exclamationis L.	V, H, D, B
clavis HUFN.	H
epsilon HUFN.	V, D
Ogygia forcipula DEN. et SCHIFF.	V, H
signifera DEN. et SCHIFF.	V
Ochropleura plecta L.	V, H, D, B
Axylia putris L.	V, D, B
Eugnorisma depuncta L.	V, D
Rhyacia simulans HUFN.	V
Chersotis rectangula DEN. et SCHIFF.	V
multangula DEN. et SCHIFF.	V
Noctua pronuba L.	V, D
fimbriata SCHREBER	V, D
janthina DEN. et SCHIFF.	V, D
interposita HBN.	V, D

Noctua orbona HUFN.	V, D
comes HBN.	V, D
Epilecta linogrisea DEN. et SCHIFF.	D
Opigena polygona DEN et SCHIFF.	V, H, D
Peridroma saucia HBN.	V, D
Diarsia brunnea DEN. et SCHIFF.	V
rubi VIEWEG	V, H
Xestia c-nigrum L.	V, H, D, B
ditrapezium DEN. SCHIFF.	H
triangulum HUFN.	V, H
rhomboidea ESP.	V, H
baja DEN. et SCHIFF.	V, H, D
xanthographa DEN. et SCHIFF.	V, D, B
castanea ESP.	V, D
Cerastis rubricosa DEN. et SCHIFF.	V, H
leucographa DEN. et SCHIFF.	H
Mesogona acetosellae DEN. et SCHIFF.	V, D
Discestra trifolii HUFN.	V, H, D, B
Hada nana HUFN.	V, D, B
Polia bombycina HUFN.	V
nebulosa HUFN.	V, H
Sideridis evidens HBN.	D
albicolon HBN.	V
Heliophobus reticulata GOEZE	V
Mamestra brassicae L.	V, D
persicariae L.	V, H
contigua DEN. et SCHIFF.	V, H, D, B
w-latinum HUFN.	V, H
thelessina HUFN.	H, D
susa DEN. et SCHIFF.	V, H, B
splendens HBN.	H
oleracea L.	V
pisi L.	V, H
bicolorata HUFN.	V, B
dysodea DEN. et SCHIFF.	V, B
Hadena rivularis F.	V, H, D
perplexa DEN. et SCHIFF.	V
irregularis HUFN.	V
luteago DEN. et SCHIFF.	V
confuse HUFN.	V
bicruris HUFN.	V, H
Eriopygodes imbecilla F.	V, H
Tholera cespitis DEN. et SCHIFF.	V, D
decimalis PODA	V, D
Panolis flammea L.	V, H
Xylomiges conspicillaris L.	V, H, B
Orthosia cruda DEN. et SCHIFF.	V, D
miniosa DEN. et SCHIFF.	V, D
opima HBN.	V, D
gracilis DEN. et SCHIFF.	V, D
stabilis DEN. et SCHIFF.	V, D
incerta HUFN.	V, D
munda DEN. et SCHIFF.	V, D
gothica L.	V, D
Hyssia cavernosa gozmanyi KOVÁCS	V, D
Perigrapha i-cinctum DEN. et SCHIFF.	V, D
Mythimna turca L.	V, D, B
conigera DEN. et SCHIFF.	V, H
ferrago F.	V, H, D, B
albipuncta DEN. et SCHIFF.	V, H, D, B
unipuncta HAW.	V
pudorina DEN. et SCHIFF.	V
impura HBN.	V, H
straminea TR.	V
pellens L.	V, H
l-album L.	V, H, D, B
Senta flammea CURTIS	V, H
Cucullia absinthii L.	D
artemisiae HUFN.	V, D
chamomillae DEN. et SCHIFF.	V
lactuceae DEN. et SCHIFF.	V, H, B

<i>Cucullia umbratica</i> L.	V, H, D, B
<i>lychnitis</i> RMBR.	V
<i>nova</i> sp. / <i>gozmanyi</i> /	V, B
<i>verbasci</i> L.	D
<i>xeranthemi</i> BSD.	V, B
<i>Calophasia lunula</i> HUFN.	V, D, B
<i>Omphalophana antirrhinii</i> HBN.	V, D, B
<i>Episema glaucina</i> ESP.	V
<i>scoriacea</i> ESP.	V
<i>Iteophaga viminalis</i> F.	V
<i>Brachionycha sphinx</i> HUFN.	V, D
<i>syriaca decipulae</i> KOV. et VAR.	D
<i>Aporophyla lutulenta</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Egira pulla</i> HBN.	V, D
<i>Lithophane socia</i> HUFN.	D
<i>ornitopus</i> HUFN.	V, D
<i>Xylena vetusta</i> HBN.	D
<i>exoleta</i> L.	V, D
<i>Allophyes oxycanthae</i> L.	V, D, B
<i>Meganephria bimaculosa</i> L.	V, D
<i>Rileyana fovea</i> TR.	V, H, D
<i>Valeria oleagina</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Dichonia aprilina</i> L.	V, D
<i>convergens</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>aeruginea</i> HBN.	V, D, B
<i>Lemprosticta culta</i> DEN. et SCHIFF.	V, B
<i>Dryobotodes eremita</i> F.	V, B
<i>monochroma</i> ESP.	V, D, B
<i>Blepharita satura</i> ESP.	V, D, B
<i>Polymixis polymita</i> L.	V, H
<i>Antitype chi</i> L.	V
<i>Ammoconia caecimacula</i> DEN. et SCHIFF.	V, D, B
<i>Eupsilia transversa</i> HUFN.	V, D
<i>Xantholeuca croceago</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Conistra vaccinii</i> L.	V, D, B
<i>ligula</i> ESP.	V, D
<i>rubiginosa</i> SC.	V, D, B
<i>veronicae</i> HBN.	V, D, B
<i>rubiginea</i> DEN. et SCHIFF.	V, D, B
<i>erythrocephala</i> DEN. et SCHIFF.	V, D, B
<i>Agrochola circellaris</i> HUFN.	V, D, B
<i>lota</i> CL.	D
<i>macilenta</i> HBN.	V, D, B
<i>nitida</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>helvola</i> L.	V, D, B
<i>humilis</i> DEN. et SCHIFF.	V, D, B
<i>litura</i> L.	V, D, B
<i>lychnidis</i> DEN. et SCHIFF.	V, D, B
<i>laevis</i> HBN.	V, D, B
<i>Atethmia ambusta</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Xanthia aurago</i> DEN. et SCHIFF.	V, D, B
<i>fulvago</i> CL.	V
<i>citrago</i> L.	V, D, B
<i>Simyra nervosa</i> DEN. et SCHIFF.	V, D, B
<i>albovenosa</i> GOEZE	V, H
<i>Acronycta megecephala</i> DEN. et SCHIFF.	V, H
<i>tridens</i> DEN. et SCHIFF.	V, H, D
<i>psi</i> L.	V, H, D
<i>auricoma</i> DEN. et SCHIFF.	V, D, B
<i>rumicis</i> L.	V, H, D
<i>Craniophora ligustri</i> DEN. et SCHIFF.	V, D, B
<i>Gryphia fraudatricula</i> HBN.	V, H
<i>algae</i> F.	V, D
<i>domestica</i> HUFN.	V, D
<i>Amphipyra pyramidea</i> L.	V, D, B
<i>berbera svenssoni</i> FLETCHER	V, D
<i>livida</i> DEN. et SCHIFF.	V
<i>tragopoginis</i> CL.	V
<i>tetra</i> F.	V
<i>Dipterygia scabriuscula</i> L.	V
<i>Rusina ferruginea</i> ESP.	V, D

Polyphaenis sericata	ESP.	V, D
Thalophila matura	HUFN.	V, H, D
Trachea atriplicis	L.	V, D
Euplexia lucipera	L.	V, H
Phlogophora meticulosa	L.	V, H, D, B
Eucarta amethystina	HBN.	V, H
Ipimorpha retusa	DEN. et SCHIFF.	H
Dyschorista ypsilon	DEN. et SCHIFF.	V, H
Dicycla oo	L.	V, D
Cosmia affinis	L.	V
pyralina	DEN et SCHIFF.	V, H
trapezina	L.	V, H
Auchmis comma	DEN. et SCHIFF.	V, D
Actinotia polyodon	CL.	V, D
hyperici	DEN. et SCHIFF.	V, D
radiosa	ESP.	D
Apamea monoglypha	HUFN.	V, H, D, B
syriaca tallosi	KOV. et VARGA	V
lithoxylaeae	DEN et SCHIFF.	V, D
sublustris	ESP.	V, H
crenata	HUFN.	V
characterae	HBN.	V
remissa	HBN	H
anceps	DEN. et SCHIFF.	V, H, B
sordens	HUFN.	V, H, D
scolopacina	ESP.	V
Oligia strigilis	L.	V
lstruncula	DEN. et SCHIFF.	V, H
turuncula	DEN. et SCHIFF.	V
Mesapamea secalis	L.	V, H, D, B
Photedes minima	HAW.	D
extrema	HBN.	H, D
morrisionii	DALE	V
pygmina	HAW.	D
Luperina testacea	DEN. et SCHIFF.	V, D
Amphipoea oculea	L.	V
Hydraecia micacea	ESP.	V, H
Gortyna flavago	DEN. et SCHIFF.	V, H
Calamia tridens	HUFN.	V, D
Calasena leucostigma	HBN.	V, H
Archanara neurica	HBN.	H
Rhizedra lutosa	HBN.	V, D, B
Charanyce trigrammica	HUFN.	V, H
Hoplodrina alsines	BRAHM	V, H, D, B
blanda	DEN. et SCHIFF.	V, D, B
ambigua	DEN. et SCHIFF.	V, D, B
superstes	O.	V
respersa	DEN. et SCHIFF.	V, D, B
Atypha pulmonaris	ESP.	H
Ceradrina morpheus	HUFN.	V, D
clavipalpis	SC.	V, D
kadenii	FRR.	V
Athetis gluteoosa	TR.	V, D
lepigone	MÖSCH.	V
Aegle koekeritziana	HBN.	V
Psilomonodes venustula	HBN.	V, D
Pyrrhia umbra	HUFN.	V, H
purpurites	TR.	V
Heliothis viriplaca	HUFN.	V, H, D, B
maritima	GRASL.	V, H, D
peltigera	DEN. et SCHIFF.	V, K
Panemeria tenebrata	SC.	V
Periphanes delphinii	L.	V
Eublemma arcuina	HBN.	D
Calymma communimacula	DEN. et SCHIFF.	V, D
Porphyrinia purpurina	DEN. et SCHIFF.	V, H, D
Jaspidia pygerga	HUFN.	V, D
Deltotes candidula	DEN. et SCHIFF.	V, H, D, B
Erastria trabealis	SC.	V, H, D, B
Acontia lucida	HUFN.	V
Tyta luctuosa	DEN, SCHIFF.	V, D

<i>Eutelia adalatrix</i> HBN.	V, D, B
<i>Earias chlorana</i> L.	V, D
<i>Bena prasinana</i> L.	V, H
<i>Pseudoips fagana</i> F.	H
<i>Diloba caeruleocephala</i> L.	V, D, B
<i>Colocasia coryli</i> L.	V, D, B
<i>Abrostola asclepiadis</i> DEN. et SCHIFF.	V, H, D, B
<i>trigemina</i> WERN.	V, H, D
<i>Diachrysia chrysitis</i> L.	V, H, D, B
<i>Macdunnoughia confusa</i> STEPH.	V, B
<i>Autographa gamma</i> L.	V, H, D, B
<i>Plusia festucae</i> L.	V
<i>Astiotes sponsa</i> L.	V
<i>Catocala nupta</i> L.	V, D, B
<i>elocata</i> ESP.	V
<i>electa</i> BKH.	V
<i>promissa</i> ESP.	V, D
<i>nymphagoga</i> ESP.	V, D
<i>hymenes</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>fulminea</i> SC.	V, D
<i>Minucia lunaris</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Callistege mi</i> CL.	V, D
<i>Euclidia glyphica</i> L.	V, D
<i>Scoliopteryx libatrix</i> L.	V, D
<i>Calpe thalictri</i> BKN.	V
<i>Lygephila pastinum</i> TR.	V
<i>cracca</i> DEN. et SCHIFF.	V, D, B
<i>limosa</i> TR.	V, H, B
<i>Aedia funesta</i> ESP.	V
<i>Laspeyria flexula</i> DEN. et SCHIFF.	H, D
<i>Parascotia fuliginaria</i> L.	V
<i>Epizeuxis calvaria</i> F.	V, D
<i>Phytometra viridaria</i> CL.	V
<i>Rivula sericealis</i> SC.	H, D
<i>Macrochilo tentacularia</i> L.	V, H, D
<i>Herminia tarsipennalis</i> TR.	V, H
<i>tarsicrinialis</i> KNOCH	V, H
<i>lunalis</i> SC.	V
<i>barbalis</i> CL.	H
<i>Paracolax derivialis</i> HBN.	V
<i>Hypena proboscidalis</i> L.	V, H, D, B
<i>rostralis</i> L.	V, H, D, B
<i>Schrankia taenialis</i> HBN.	V
<i>Trisateles emortualis</i> STEPH.	V, H

#### Geometridae

<i>Alsophila quadripunctata</i> ESP.	V, D
<i>aescularia</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Asthena albulata</i> HUFN.	V, D
<i>Hydraelia flammeolaria</i> HUFN.	V, H
<i>Epirrita dilutata</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Operophtera brumata</i> L.	V, D
<i>Larentia clavaria</i> HAW.	V
<i>Anticlea badiata</i> DEN. et SCHIFF.	V, H
<i>derivata</i> DEN. et SCHIFF.	V, H
<i>Pelurga comitata</i> L.	V, H
<i>Colostygia pectinataria</i> KNOCH.	V, H
<i>Cosmorhoe ocellata</i> L.	V, H
<i>Eulithis mellinata</i> L.	V, H
<i>pyraliata</i> DEN. et SCHIFF.	V, H
<i>Chloroclysta truncata</i> HUFN.	V
<i>Cidaria fulvata</i> FORST.	V, H
<i>Thera juniperata</i> L.	V, D
<i>Electrophaes corylata</i> THNBG.	V, H, D
<i>Hydriomena impluviata</i> DFN. et SCHIFF.	V
<i>Horisme vitalbata</i> DEN. et SCHIFF.	V, H, D
<i>tersata</i> DEN. et SCHIFF.	V, H, D
<i>corticata</i> TR.	V

Melanthia procellata DEN. et SCHIFF.	V, H, D
Pareulype berberata DEN. et SCHIFF.	V
Rheumaptera cervinalis SC.	V
Triphosa dubitata L.	V, H
Philereme vetulata DEN. et SCHIFF.	V, H
Perizoma alchemillata L.	V, H, D
lugdunaria H. S.	D
bifasciata HAW.	V
flavofasciata THNBG.	V, H
Xanthorrhoe biriviata BKH.	V, H
designata HUFN.	V, H
spadicearia DEN. et SCHIFF.	V, H, D
ferrugata CL.	V, H, D
fluctuata L.	V, H, D
Scotopteryx moeniata SC.	V, H, D
bipunctaria DEN. et SCHIFF.	V, H, D
mucronata SC.	D
Catarhoe rubidata DEN. et SCHIFF.	V, H
cuculata HUFN.	V, H, D, B
Epirrhoe tristata L.	V, H
alternata MULL.	V, D, B
rivata HBN.	V, D, B
galiata DEN. et SCHIFF.	V, H
Costaconvexa polygrammata BKH.	V, D
Camptogramma bilineata L.	V, D
Catachlysme riguata HBN.	V, H
Aplocera plagiata L.	V, D, B
Lithostege farinata HUFN.	V, H
Lythris purpuraria L.	D
Lobophora halterata HUFN.	D
sexalata RETZ.	V, H
Trichopteryx viretata HBN.	V, H
Eupithecia inturbata HBN.	D
haworthiata DBLD.	V, H
linariata DEN. et SCHIFF.	V, H
venosata F.	V
egenaria H. S.	H
centaureata DEN. SCHIFF.	V, H, D
gueneata MILL.	V, D
tresignaria H.S.	H
intricata ZETT.	H
veratraria H.S.	V
tripunctaria H.S.	V, H, D
plumbeolata HAW.	V
denotata HBN.	V
vulgata HAW.	H
indigata HBN.	V
castigata HBN.	V
icterata VILL.	V, D
succenturiata L.	V, H, D
insignata HBN.	H
millefoliata RÖSSL.	D
distinctaria H.S.	V, H, D
grapheta TR.	D
pimpinellata HBN.	V
innotata HUFN.	V, D
virgaureata DBLD.	V
dodoneata GUEN.	V, H, D, B
sobrinata HBN.	D
ericeata RMBR.	D
Gymnoscelis rufifasciata HAW.	V
Chlorocystis v-ata HAW.	V, H
Callicystis rectangulata L.	H, D
Ideea rufaria HBN.	V
aureolaria DEN. et SCHIFF.	V
muricata HUFN.	D
rusticata DEN. et SCHIFF.	V
filicata HBN.	V, D
moniliata DEN. et SCHIFF.	V
politata HBN.	V
dilutaria HBN.	V
humiliata HUFN.	V, D

<i>Idaea seriata</i> SCHRANK	V, D
<i>subsericeata</i> HAW.	V
<i>trigeminata</i> HAW.	V
<i>emarginata</i> L.	V
<i>fuscconervosa</i> GOEZE	V
<i>dimidiata</i> HUFN.	V
<i>aversata</i> L.	V
<i>rubraria</i> STGR.	V, D
<i>degeneraria</i> HBN.	V, D
<i>inornata</i> HAW.	V, H, D
<i>deversaria</i> H. S.	V
<i>Calothyssanis amata</i> L.	V, H, D, B
<i>Cyclophora annulata</i> SCHULZE	V, H, D
<i>ruficiliaris</i> H.S.	V, H, D
<i>quercimontaria</i> BASTELEB.	V
<i>porata</i> L.	V, D
<i>punctaria</i> L.	V
<i>linearis</i> HBN.	V, H
<i>Scopula immorata</i> L.	V
<i>subpunctaria</i> H.S.	V
<i>nigropunctaria</i> HUFN.	V
<i>virgulata</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>ornata</i> SC.	V, H, D
<i>rubiginata</i> HUFN.	V, H, D
<i>marginepunctata</i> COEZE	V, D, B
<i>incanata</i> L.	V, H
<i>immutata</i> L.	V, H, D
<i>flaccidaria</i> Z.	V, D
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> CL.	V, H, D
<i>Abraxas grossulariata</i> L.	V
<i>Lomaspidis marginata</i> L.	V, H
<i>Ligdia adustata</i> F.	V, H
<i>Stegania dilectaria</i> HBN.	H
<i>Semiothisa alternaria</i> HBN.	V, H
<i>liturata</i> CL.	V, H, D
<i>Chiasmia clathrata</i> L.	V, H, D, B
<i>glarearia</i> BRAHM	V, H, D, B
<i>Tephрина murinaria</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Flagodis pulveraria</i> L.	V, H
<i>dolebraria</i> L.	V, H, B
<i>Opisthograptis luteolata</i> L.	V, H, D
<i>Pseudopanthera macularia</i> L.	V, H, D
<i>Therapis flavicaria</i> DEN. et SCHIFF.	V
<i>Apeira syringaria</i> L.	V, H
<i>Ennomos erosaria</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>quercaria</i> HBN.	V, D
<i>Selenia dentaria</i> F.	V, H
<i>lunularia</i> HBN.	V, H
<i>tetralunaria</i> HUFN.	V, H, B
<i>Artiora evonymaria</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Crocallis tusciaria</i> BKH.	V, D, B
<i>elinguaris</i> L.	V, D
<i>Ourapteryx sambucaria</i> L.	V
<i>Colotois pennaria</i> L.	V, D
<i>Angerona prunaria</i> L.	V, D
<i>Apocheima pilosaria</i> HBN.	D
<i>hispidaria</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Lycia zonaria</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>hirtaria</i> CL.	V, D
<i>Biston strataria</i> HUFN.	V, D
<i>betularis</i> L.	V, D
<i>Agriopsis leucophaearia</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>bajaria</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>aurantiaria</i> HBN.	V, D
<i>marginaria</i> BKH.	V, D
<i>Ereannis defoliaria</i> CL.	V, D
<i>Synopsis sociaria</i> HBN.	V, H, D
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> DEN. et SCHIFF.	V
<i>Selidosema brunnearia</i> VILL.	V
<i>plumaria</i> VILL.	D
<i>Cleora cinctaria</i> DEN. et SCHIFF.	V, H, B

<i>Alcis repandata</i> L.	V
<i>Boarmia punctinalis</i> SC.	V, H
<i>arenaria</i> HUFN.	V, H
<i>viertlii</i> BOHATSCH	V, D
<i>Ascotis selenaria</i> DEN. et SCHIFF.	V, D
<i>Ectropis bistortata</i> GOEZE	V, B
<i>consonaria</i> HBN.	V, H
<i>extersaria</i> HBN.	V, H
<i>Cabera exanthemata</i> SC.	V, H
<i>pusaria</i> L.	V
<i>Lomographa bimaculata</i> F.	V, H
<i>temerata</i> DEN. et SCHIFF.	V, H
<i>Compaea margaritata</i> L.	V
<i>Odontognophos dumetata</i> TR.	V
<i>Gnophos furvata</i> L.	V, D
<i>obscurata</i> HBN.	V, D
<i>Petrophora chlorosata</i> SCOP.	V
<i>Siona lineata</i> L.	V
<i>Aspitates gilvaria</i> DEN. et SCHIFF.	V, H, D
<i>Pseudoterpna pruinata</i> HUFN.	V
<i>Comibaena pustulata</i> HUFN.	V, H
<i>Thetidia smaragdaria</i> F.	V, H
<i>Hemithea aestivaria</i> HBN.	V, H
<i>Chlorissa viridata</i> L.	V
<i>cloraria</i> HBN.	V
<i>pulmentaria</i> GUEN.	V
<i>Thalera fimbrialis</i> SC.	V
<i>Hemistola chrysoprasaria</i> ESP.	V, H, D

#### Thyatiridae

<i>Habrosyne pyritoides</i> HUFN.	V, H
<i>Thyatira batis</i> L.	V
<i>Palimpsestis duplaris</i> L.	V, H
<i>Tethea</i> or F.	V
<i>Polyphoca diluta</i> F.	V, D
<i>ruficollis</i> F.	V, D
<i>ridens</i> F.	V, D

#### Drepanidae

<i>Platypteryx curvatula</i> BKH.	V
<i>herpagula</i> ESP.	V, H, D
<i>Drepana cultraria</i> F.	V, H
<i>binaria</i> HUFN.	V, D
<i>Cilix glaucatus</i> SC.	V, H, D, B

#### Attacidae

<i>Saturnia pyri</i> DEN. et SCHIFF.	V, H, B
<i>Eudia pavonia</i> L.	V

#### Lesioceridae

<i>Malacosoma castrensis</i> L.	V, D
<i>Trichiura crataegi</i> L.	D
<i>Foecilocampa populi</i> L.	V, D
<i>Eriogaster ramicola</i> HBN.	V, D, B
<i>catax</i> L.	D, B
<i>Pachygastris trifolii</i> ESP.	V, D
<i>Macrothylecia rubi</i> L.	V, H, D, B
<i>Epicnaptera tremulifolia</i> HBN.	V, D
<i>Gastropacha quercifolia</i> L.	V
<i>Odonestis pruni</i> L.	V, H
<i>Dendrolimus pini</i> L.	V, H

Lemonidae

Lemonia taraxaci ESP. V, D  
 dumii L. V, B

Sphingidae

Herse convolvuli L. V, D  
 Sphinx ligustri L. V, B  
 Hyloicus pinastri L. V, H, B  
 Mimas tiliae L. H, D  
 Marumba quercus L. V  
 Smerinthus ocellata L. V, H  
 Laothoe populi L. V, H  
 Haemorrhagia tityus L. V  
 Deilephila elpenor L. V, H  
                   porcellus L. V, H, D, B  
 Hyles euphorbiae L. V, H  
                   lineata livornica ESP. V  
 Macroglossum stellatarum L. V

Papilionidae

Parnassius mnemosyne L. V  
 Iphiclidea podalirius L. V  
 Papilio machaon L. V

Pieridae

Leptidea sinapsis L. V, H, D  
                   morsei major GRUND. D  
 Gonepteryx rhamni L. V, H  
 Colias croceus FOURC. H, D  
                   chrysotheme ESP. B  
                   australis calida VRTY. V, D, B  
                   hyale L. V, D  
 Anthocharis cardamines L. V, H  
 Pontia daplidice L. V, H, D  
 Pieris brassicae L. V, H, D  
                   rapae L. V  
                   napi L. V  
 Aporia crataegi L. V

Nymphalidae

Issoria lathonia L. V, H  
 Clossiana euphrosyne L. V  
                   dia L. V, H  
 Brenthis hecate L. U  
 Argynnis paphia L. H  
 Fabriciana berecynthia PODA V, H, D  
                   niobe L. V, H  
 Mesoacidalia aglaja L. V, H  
 Melitaea didyma ESP. V, U  
                   cinxia L. V  
                   phoebe SCHIFF. V  
 Mellicta athalia ROTT. V, D  
                   britomartis ASSM. V  
                   aurelia NICK. V  
 Araschnia levana L. H  
 Polygonia c-album L. V, H  
 Nymphalis polychloros L. H  
 Inachis io L. V, H  
 Aglais urticae L. V, H, D  
 Cynthia cardui L. V, H  
 Vanessa atalanta L. V, D  
 Ladoga camilla L. H  
 Apatura ilia SCHIFF. H, D

Satyridae

Coenonympha iphis SCHIFF.	V, H
pamphilus L.	V, H
arcania L.	V
Maniola jurtina L.	V, H
Lasionmata megaera L.	V, H
maera L.	V, H
Pararge aegeria L.	V, D
Aphantopus hyperantus L.	V, H
Minois dryas SC.	V, H, D, B
Brintesia circe F.	V, B
Arethusana arethusa SCHIFF.	D
Hipparchia fagi SC.	V
Melanargia galathea L.	V, H, D, B

Nemeobiidae

Haemaris lucina L.	V, H
--------------------	------

Lycaenidae

Thecla quercus L.	V, H
betulae L.	V, H, D
pruni L.	V
w-album KNOCH	V
spini SCHIFF.	V
acaciae F.	V
ilicis ESP.	U
Callophrys rubi L.	H
Heodes tityrus PODA	H
Thersamonia dispar HAW.	H
Palaeochrysopehanus hippothoe L.	H
Everes argiades PALL.	V, H
alcetas HFFMGG.	H
decolorata STGR.	V, H
Cupido minimus FUESSL.	V, D
Celastrina argiolus L.	V
Pseudophilotes vicrama MOORE	V
Jolana jolas O.	V, U
Glaucopsyche alexis PODA	V, D
Lycaeides argyrognomon BGSTR.	V, H, D
idas L.	V, H
Plebejus argus L.	V, H
Aricia agestis DEN. et SCHIFF.	A
Cyaniris semiargus ROTT.	K
Polyommatus icarus ROTT.	V, D, B
Plebicula dorylas SCHIFF.	V
amandus SCHN.	V
thersites CANT.	V
Lysandra bellargus ROTT.	V
coridon PODA	V, H, D
Meleageria daphnis SCHIFF.	V

Hesperiidae

Erynnis tages L.	V, H, D
Pyrgus malvae L.	V, D
fritillarius PODA	D
serratulae RMBR.	V
armoricanus OBTH.	V
Spialia orbifer HBN.	V
Carterocephalus palaemon PALL.	H
Thymelicus acteon ROTT.	D
lineola C.	V, D
Hesperia comma L.	V, D

Felsorolásunkban a Bakonyi Természettudományi Múzeum anyagára támaszkodó /Konkay L.: A Bakony hegység éjjeli nagylepkeinek jegyzéke Zirc, 1980/ jól megszokott nevezéktanát használtuk. A fajok bizonyító példányai a szerzőknél illetve a Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményében találhatóak. A problémásabb állatok meghatározásában nagy segítséget nyújtott dr. Vojnits András és dr. Konkay László, melyért ezúton is köszönetet mondunk.

## IRODALOM — LITERATUR

- ABAFI-AIGNER L. /1907/: Magyarország nagylepkéi Budapest
- FORSTER, W.-WOHLFAHRT, TH. A. /1973-74/: Die Schmetterlinge Mitteleuropas V. Spanner /Geometridae/ Stuttgart
- GOZMÁNY L. /1970: Bagolylepkék I./Noctuidae I./ - Fauna Hung. XVI. 11.
- HERCZIG B.-BÜRGÉS GY. /1979/: Adatok a Keszthelyi-hegység nagylepkéinek ismeretéhez - Folia Ent. Hung. 32: 228-230
- HIGGINS, L. G.-RILEY, N. D. /1970/: Die Tagfalter Europas und Nordwest-afrikas Hamburg
- KÁLLÓ I.-SIMONYI S.-SZÉCSÉNYI L. /1980/: Adatok a Balaton-felvidék nagylepkefaunájához /Macrolepidoptera/ - A nyolcadik Bakonykutató ankét anyaga, p. 11-14
- KOCH, M. /1958-64/: Wir bestimmen Schmetterlinge I-IV. Berlin
- KOVÁCS, L. /1966/: Data to the knowledge of Hungarian Macrolepidoptera I. - Ann. Hist.-nat. Mus. Hung. 58: 453-468
- PEREGOVITS L. /1983/: A Tapolcai-medence és a Bakonyalje nagylepke faunájának természetvédelmi jelentősége és állatföldrajzi vizsgálata-szakdolgozat, Budapest
- RÉZBÁNYAI L. /1981/: Az Eilema pseudocomplana Daniel Magyarországon - Folia Ent. Hung. 42: 241-246
- SZÉCSÉNYI, L. /1985/: The description of the female of *Brachionyca syriaca decipulae* Kovács, 1966 /Lepidoptera: Noctuidae/ - Folia Ent. Hung. 46: 169-172.
- VARGA Z. /1964/: Magyarország állatföldrajzi beosztása a nagylepke fauna komponensei alapján - Folia Ent. Hung. 17: 119-167
- VOJNITS A. /1980/: Araszolólepkék I. /GEOMETRIDAE I./ - Fauna Hung. XVI. 8.

## BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER MACROLEPIDOPTEREN-FAUNA DES PLATTENSEE-HOCHLANDES, II. VÁSZOLY UND UMGEBUNG

Die im Rahmen des Programms "Das Naturbild des Bakony-Gebirges" bisher durchgeführten Makrolepidopteren-faunistischen Forschungen haben uns einen allmählich umfassender werdenden Überblick über die Gross-Schmetterlinge dieses Gebietes sowie deren Biotope und die zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge gegeben. Im vorliegenden Aufsatz möchten Verff. aufgrund von ihren 10jährigen Untersuchungen die Makrolepidopteren-Fauna der Umgebung von Vászoly und Dörgicse in grossen Zügen festlegen sowie die charakteristischen Biotope beschreiben. Gesammelt wurden insgesamt 670 Arten, von welchen einige hervorgehoben werden müssen, und die charakteristische Komponente repräsentieren zu können. Unten diesen Arten gibt es mehrere seltene Gross-Schmetterlinge. Darauf folgend wird eine aufgrund der Verbreitungstypen durchgeführte Einreihung der Arten dargelegt. Auf dieser Weise kann man die Mannigfaltigkeit der Fauna ohne weitgehende Schlussfolgerungen ziemlich gut veranschaulichen. Verff. möchten ihre Forschungen in der Zukunft auf grössere Gebiete ausbreiten, um damit die Kenntnis der Fauna des Plattensee-Hochlandes und anderer Gebiete des Bakony-Gebirges mit weiteren Beiträgen zu vervollständigen.

\ A szerzők címe /Anschrift der Verfasser/:

KÁLLÓ Imre  
1182 Budapest  
Batthyányi u. 182.

SIMONYI Sándor  
1031 Budapest  
Sajtóló u. 2.

SZÉCSÉNYI Lajos  
1133 Budapest  
Váci u. 86/B.